III

Forster

1788

~~P. 13. S. 122.~~

~~13~~

"Rare This we think the
earliest flora of the
Australian Islands."
Aer. To Library Circ 1943 4.
5-11-43

No! See Cheeseman Introd
in Trans Linn Soc XVII

Rare Book
QK 431
.F63
1786

FLORVLAE INSVLARVM AVSTRALIVM PRODROMVS

AVCTORE

GEORGIO FORSTER M. D.

SERENISSIMO REGI POLONIAE A CONSILIIS INTIMIS HISTORIAE NATVRALIS ET BOTANICES IN ACADEMIA VILNENSI P. P. O. ACADEMIAE CAESAREAE NATVRAE CVRIOSORVM REGIAE MEDICAE MADRITENSIS REGIAR. SOCIETATVM SCIENTIARVM LONDINENSIS ET HAVNIENSIS SOCIETATVM ANTIQVITATVM ET REI AGRARIAE QVAE CASSELLIS SVNT REI AGRARIAE CELLENSIS ET NATVRAE SCRVTATOR. BEROLINENSIS SODALI NEC NON REGIIS SOCIETATIB. GOTTINGENSI SCIENTIARVM ET PARISINAE REI AGRARIAE LITTERARVM COMMERCIO CONIVNCTO.

V. 25

MUSEO
BOTANICA
HISTORIAE NATVRALIS
BIBLIOTHECA
WEBBIANA

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
MAR 6 1939
GARDEN LIBRARY

GOTTINGAE

TYPIS JOANN. CHRISTIAN. DIETERICH.

MDCCLXXXVI.

3-6-39

VIRO

EXCELLENTISSIMO ET CELEBERRIMO

ANDREAE SPARRMANNO

MEDICINAE DOCTORI
PROFESSORI HISTORIAE NATVRALIS
MVSEI HOLMIENSIS ACADEMICI PRAEFECTO
ACADEMIAE REGIAE SCIENTIARVM HOLMIENSIS
SOCIETATIS PHYSIOGRAPHICAE LVNDINENSIS
MEMBRO &c.

FLORVLAE

COMMVNI STVDIO ORNATAE

RECENSVM

D.

GEORGIVS FORSTER.

PRAEFATIO.

Ex itinere circa globum terraqueum redux anno MDCCLXXV, coniunctim cum patre optimo *Characterum nouorum generum plantarum* adumbrationem typis tabellisque aeneis exaratam publici iuris feci. Hanc breui, vt ſperabam, ita pollicebar deſcriptiones integras ſtirpium orbis auſtralis inſequuturas. Haud igitur ab re eſſet enumerare cauſſas, quae harum diuulgationem impediverunt; verum piget querelis quamuis iuſtis immorari.

Interim vndecimus ab editione nouorum generum vertitur annus. Species plantarum complures, a nobis primum detectae, alienis curis prodierunt in lucem, ſiue quod in ſolo natali iterum deprehenſae fuerunt, ſiue quod, etſi a nobis mutuatae, alieno nomini minus religioſe illae addictae ſunt. Facile quidem tolerari poterat iactura tantillae, inuenti legitimis auctoribus erepti, gloriolae. Sed non potuit non vitium ſubrepere deſcriptiunculis alienis iuxta ſicca plantarum exemplaria congeſtis et feſtinanter nimis in medium prolatis. Quae cum ita eſſent, iam vltro videbar adſtipulari erroribus, ni publice in eosdem animaduerterem. Attamen eadem, quae olim, obſtacula manum noſtro operi admotam inhibent. Qui in colligendas haſce naturae diuitias aes publicum impenderunt, ad earundem communicationem cum orbe erudito ſumtus denegant, librarii redemtionem recuſant; vetat res familiaris

familiaris tot figurarum ſcalpturas, quae deſcriptionibus illuſtrandis inſeruiunt, priuatis opibus moliri. Quid multa? Praemittendum itaque exploratoris vice catalogum Florulae Polyneſiae conſtitui, certiorem me redditurum, num in promtu mihi ſint auxiliatrices manus, quibus omnibus his anguſtiis expediar? Enimuero, niſi cuncta me fallunt, praeſagiens iam animo tot inter potentiſſimos Europae principes exorientem Muſagetam video, qui noſtrorum tentaminum fautorem ſe praeſtet, Floraeque auſtralis ornandae honorem Britannis eripiat.

Nomina plantarum, quas cum amiciſſimo SPARRMANNO in oceani auſtralis inſulis legimus deſcripſimusque, ſolis differentiis ſpecificis et locis natalibus adiectis, huic prodromo inſerui, excluſis ſtirpibus magellanicis, nec non iis quas in atlantici maris inſulis offendimus. Species cognitas omnes

ad

ad Illuſtris MURRAYI editionem decimam quartam ſyſtematis vegetabilium retuli, emendatis hinc inde differentiis ſpecificis, quas fide ſupplementi plantarum a Linneo, filio, editi, in eximium opus ſuum receperat vir celeberrimus. Genera noua nonnulla, inſtituta diligentiore comparatione, deleui; quae autem temere nimis ab aliis ad genera cognita relata fuerunt, reſtitui. Plantas dubias porro et obſcuras aut imperfecte deſcriptas ſeorſim enumerandas eſſe iudicaui, ne et ſpecies probe determinatae vna vacillarent.

Scribebam Vilnae Lituanicae, d. XXX. Junii MDCCLXXXVI.

FLORVLAE

FLORVLAE
INSVLARVM AVSTRALIVM
PRODROMVS.

CLASSIS I.
MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMVM.

1. A. *Zerumbet*, ſcapo nudo, ſpica oblonga obtuſa.
MVRRAY *Syſtema Vegetabilium* edit. XIV. p. 50. n. 2.
Taheiti et reliquae Societatis inſulae.

2. A. *Curcuma*, ſcapo ſpathis laxis e centro foliorum.
M. S. V. p. 40. n. 5.
Culta intra tropicos et in Paſchatis inſula.

THALIA.

3. T. *cannaeformis*, corollis hexapetalis: nectario bifido erecto. F.
Mallicollo inter nouas Hebrides.

BOERHAAVIA.

4. B. *erecta*, caule erecto glabro, floribus diandris. M. *S. V.* p. 52. n. 1. Insulae Societatis. FORST. *pl. Esculent. inf. Oc. austr.* 41.

5. B. *tetrandra*, caule repente, floribus tetrandris. F. Ibidem.

DIGTNIA,

MNIARVM.

6. M. *biflorum*. M. *S. V.* p. 53. FORST. *Charact. Gen.* 1. Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

IASMINVM.

7. I. *simplicifolium*, foliis oppositis ouato-lanceolatis simplicibus. F.
Amicorum Insulae.

8. I. *didymum*, foliis oppositis ternatis, foliolis ouato-lanceolatis acuminatis integerrimis. F.
Societatis Insulae.

VERONICA.

9. V. *Catarractae*, racemis terminalibus flexuosis, caule suffruticoso, foliis lanceolatis serratis F.
Noua Zeelandia.

10. V. *elliptica*, racemis lateralibus, caule fruticoso, foliis ellipticis integerrimis. F.
Ibidem.

11. V. *salicifolia*, racemis lateralibus nutantibus, caule fruticoso, foliis longo-lanceolatis integerrimis. F.
Ibidem.

IVSTICIA.

12. I. *repanda*, fruticosa, foliis ouatis repandis: pedunculis axillaribus trifidis. F.
Tanna.

13. I. *longifolia*, ſuffruticoſa, foliis linearibus ſinuatis: pedunculis axillaribus trifidis. F.
Ibidem.

DIANTHERA.

14. D. *caerulea*, vmbella faſciculata ſeſſili ſimpliciſſima. F.
Botanices inſula, prope Nouam Caledoniam.

15. D. *clauata*, panicula ſubumbellata compoſita, pedunculis apice dilatatis. F.
Societatis inſulae.

GRATIOLA.

16. G. *Monnieria*, foliis ouali-oblongis, pedunculis vniflоris, caule repente. M. *S. V.* p.64. n. 2.
Inſulae Marchionis.

VERBENA.

17. V. *nodiflora*, tetrandra, ſpicis capitato-conicis, foliis ſerratis, caule repente. M. *S. V.* p.66. n.10.
Tanna.

DIGTNIA.

ANTHOXANTHVM.

18. A. *crinitum*, panicula coarctata, ariſtis longiſſimis. F.
A. crinitum. M. *S. V.* p. 73. n. 4.
Noua Zeelandia.

TRIGTNIA.

PIPER.

19. P. *Siriboa*, foliis inaequaliter cordatis ſubſeptemneruiis venoſis. M. *S. V.* p. 74. n. 5.
Noua Caledonia.

20. P. *excelſum*, foliis orbiculato-cordatis ſubſeptemneruiis: pedunculis terminalibus ſolitariis bifidis, caule arboreo. F.
Noua Zeelandia.

21. P. *methyſticum*, foliis cordatis acuminatis multineruiis: ſpicis axillaribus ſolitariis breuiſſimis pedunculatis patentiſſimis. FORST. *Plant. Eſc. Inſular. Oc. Auſtr.* 50.
Inſulae Societatis, Amicorum, Sandwigiae. Culta.

22. P. *latifolium*, foliis orbiculato-cordatis nouemnerviis: ſpicis axillaribus aggregatis pedunculatis. F.
P. latifolium. M. *S. V.* p. 74. n. 15.
Societatis, Amicorum, Nouarumque Hebridum inſulae.

23. P. *acuminatum?* foliis lanceolato-ouatis neruoſis carnoſis. M. *S. V.* p. 74. n. 11.
Societatis inſulae.

24. P. *pallidum*, foliis alternis obouatis ſubtrineruiis: ſpicis ſolitariis ſubterminalibus. F.
Ibidem.

25. P. *tetraphyllum*, foliis quaternis rhombeis ſeſſilibus carnoſis. F.
Ibidem.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

COMMELINA.

26. C. *virginica*, ? corollis subaequalibus, foliis lanceolatis ore barbatis, caulibus erectis? M. *S V*. p. 94. n. 5.
Tongatabu.

CYPERVS.

27. C. *odoratus*, culmo triquetro nudo, vmbella decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis. M. *S. V*. p. 97. n. 19.
Societatis insulae.

SCIRPVS.

28. S. *dichotomus*, culmo triquetro nudo, vmbella decomposita, spicis dichotomiae sessilibus. M. *S. V*. p. 100. n. 24.
Societatis insulae.

29. S. *junceus*, culmo teretiusculo filiformi nudo, spica ouata terminali, glumis inuolucri longitudine spicae, tribus mucronatis. F.
Ibidem.

KYLLINGA.

30. K. *monocephala*, culmo filiformi triquetro, capitulo globoso sessili, inuolucro triphyllo longissimo. M. *S. V*. p. 101. n. 1.
Societatis insulae.

31. K. *trieps*, capitulis terminalibus ſubternis, glomeratis ſeſſilibus. M. *S. V.* p. 101. n. 2.
Thryocephalon nemorale FORST. *Charact. gen.* 65.
Ibidem.

DIGTNIA.

SACCHARVM.

32. S. *ſpontaneum*; panicula laxa, ſpicis filiformibus ſimplicibus, floribus remotis geminatis ariſtatis: altero pedunculato. F.
S. ſpontaneum M. *S. V.* p. 103. n. 1.
Societatis inſulae.

33. S. *officinarum*, floribus paniculatis, lanugine floſculis longiore. F. *pl. eſc.* 51.
S. officinarum. M. *S. V.* p. 103. n. 2.
Culta intra tropicos et in Paſchatis inſula.

PHALARIS.

34. P. *canarienſis*, panicula ſubouata ſpiciformi, glumis carinatis. M. *S. V.* p. 103. n. 1.
Noua Zeelandia.

PASPALVM.

35. P. *orbiculare*, ſpicis alternis, rachi membranacea, floribus duplici ordine ſecundis orbiculatis laeuibus. F.
Societatis inſulae.

PANICVM.

36. P. *hiſpidum*, ſpicis alternis ſubdiuiſis ſecundis, floſculis geminatis alternis ſecundis hiſpidis. F.
Noua Caledonia.

37. P. *ſanguinale*, ſpicis digitatis baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. M. *S. V.* p. 106. n. 13.
Societatis inſulae.

38. P. *filiforme*, ſpicis ſubdigitatis approximatis erectis linearibus, rachi flexuoſa, dentibus biflоris: altero ſeſſili. M. *S. V.* p. 106. n. 15.
Ibidem et Paſchatis inſula.

39. P. *compoſitum*, ſpica compoſita, ſpiculis linearibus ſecundis, floſculis geminis remotis, calycibus ariſtatis. M. *S. V.* p. 106. n. 18.
Ibidem.

AGROSTIS.

40. A. *ouata*, petalo exteriore ante apicem ariſtato, panicula ouata, coarctata ſpiciformi. F.
Noua Zeelandia.

AIRA.

41. A. *antarctica*, foliis planis, panicula compoſita patente, calycibus trifloris, floſculis medio ariſtatis, ariſta elongata rectiuſcula. F.
Noua Zeelandia.

POA.

42. P. *Eragroſtis*, panicula patente, pedicellis flexuoſis, ſpiculis ſerratis decemfloris, glumis trineruiis. M. *S. V.* p. 114. n. 17.
Noua Caledonia.

43. P. *anceps*, panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris acutis baſi pubeſcentibus, culmo ancipite. F.
Noua Zeelandia.

44. P. *latifolia*, panicula diffuſa nutante, ſpiculis remotis biflоris, altero pedicellato, margine ſetoſo. F.

An

An Holcus latifolius? M. *S. V.* p. 905. n. 12.
Insulae Societatis.

CYNOSURUS.

45. C. *indicus*, spicis digitatis linearibus, culmo compresso declinato basi nodoso, foliis alternis. M. *S. V.* p. 117. n. 10.
Insulae Societatis.

AVENA.

46. A. *filiformis*, panicula erecta tenuissima, calycibus unisloris, aristis calyce duplo longioribus. F.
Noua Zeelandia et insula Paschatis.

ARUNDO.

47. A. *Bambos*, calycibus multisloris, spicis ternis sessilibus. M. *S. V.* p. 123. n. 1.
Passim intra tropicos.

48. A. *conspicua*, calycibus unisloris, panicula laxa erecto-patente, petali exterioris arista reflexa longissima. F.
Noua Zeelandia.

ROTTBÖLLA.

49. R. *Coelorachis*, spica tereti unilaterali, flosculis geminis altero pedicellato: calyce biualui. F.
Tanna.

50. R. *repens*, spica tereti subulata, gluma calycina uniualui indiuisa. F.
Insulae intra tropicos.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGTNIA.

PETESIA.

51. P. *carnea*, foliis oblongo-lanceolatis laeuibus: cymis terminalibus trifidis. F.
Namoka.

ANCISTRVM.

52. A. *diandrum*, floribus diandris. F.
A. anserinaefolium. FORST. *Charact. gen.* 2.
A. Sanguisorbae. M. *S.V.* p. 73. n. 1.
Noua Zeelandia.

BLACKBVRNIA.

53. B. *pinnata*. FORST. *Charact. gen.* 6.
Norfolciae insula deserta.

FAGARA.

54. F. *Evodia*, foliis ternatis, foliolis integris. F.
F. Evodia. M. *S.V.* p. 160. n. 1.
Evodia hortensis. FORST. *Charact. gen.* 7.
Insulae Amicorum et nouae Hebrides.

OLDENLANDIA.

55. O. *foetida*, vmbella terminali trichotoma, foliis spatulatis. F.
Tonga-tabu.

56. O. *debilis*, vmbellis axillaribus pedunculatis pauciflоris: foliis ouatis sessilibus. F.
Ibidem.

57. O. *tennifolia*, pedunculis axillaribus solitariis vnifloris: foliis lineari-subulatis. F.
O. tenuifolia. BURM. *ind.* p. 47. tab. XIV. f. 1.
Tanna.

DORSTENIA.

58. D. *lucida*, caulescens, foliis oblique ouatis integris laeuibus, pedunculis cymosis axillaribus. F.
Elatostema pedunculatum. FORST. *Charact. gen.* 53. n. 1.
Societatis insulae.

59. D. *pubescens*, caulescens, foliis oblique ouatis serratis pubescentibus: pedunculis axillaribus capituliferis. F.
Elatostéma sessile. FORST. *Charact. gen.* 53. n. 2.
Ibidem.

EMBOTHRIVM.

60. E. *vmbellatum*, vmbellis axillaribus simpliciſſimis pedunculatis, antheris sessilibus. FORST. *Charact. gen.* 8. n. 2.
E. vmbellatum. M. *S. V.* p. 166. n. 1.
Noua Caledonia.

TETRAGYNIA.

TILIAEA.

61. T. *muscosa*? procumbens, floribus trifidis. M. *S. V.* p. 170. n. 4.
Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

62. M. *ſpatulata*, ſeminibus laeuibus, foliis ſpatulatis hiſpidis, pedunculis axillaribus ſolitariis vnifloris. F.
Noua Zeelandia.

LITHOSPERMVM.

63. L. *incanum*, ſeminibus aſperis: ſpicis terminalibus compoſitis coarctatis, foliis linearibus villoſis. F. b.
Inſula Teautea et inſula ferox (Savage I).

TOURNEFORTIA.

64. T. *argentea*, foliis ouatis obtuſis tomentoſo-ſericeis: ſpicis terminalibus compoſitis. M. *S. V.* p. 191. n. 7.
Amicorum inſulae.

LYSIMACHIA.

65. L. *decurrens*, racemis ſimplicibus terminalibus, corollae ſegmentis obtuſis: ſtaminibus corolla longioribus. F.
Tanna.

OPHIORRHIZA.

66. O. *ſubumbellata*, caule fruticoſo, foliis lanceolatis acutis: vmbellis axillaribus trifidis. F.
Taheiti.

SHEFFIELDIA.

SHEFFIELDIA.

67. S. *repens*. FORST. *Charact. gen.* 9. M. *S. V.* p. 198. n. 1.

Noua Zeelandia et insula Paschatis.

EPACRIS.

* fructu capsulari.

68. E. *longifolia*, arborea, foliis lineari-lanceolatis basi vaginantibus: racemis erectis articulatis lateralibus. F.

E. longifolia. FORST. *Charact. gen.* 10. n. 1. M. *S. V.* p. 198. n. 1.

Noua Zeelandia.

69. E. *rosmarinifolia*, fruticosa, foliis linearibus obtusis rigidis vaginantibus: floribus solitariis lateralibus. F.

Ibidem.

70. E. *pumila*, herbacea? foliis ouato-oblongis imbricatis: floribus sessilibus subsolitariis terminalibus. F.

E. pumila. FORST. *Charact. gen.* 10. n. 3. M. *S. V.* p. 198. n. 3.

Ibidem.

** fructu baccato; *Stipheliae*, Solandr.

71. E. *juniperina*, arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis, ferrulatis: floribus sessilibus solitariis terminalibus. F.

E. juniperina. FORST. *Charact. gen.* 10. n. 2.

Ibidem.

72. E. *fasciculata*, arborea, foliis confertis linearibus acuminatis: racemis spicatis lateralibus cernuis. F.

E. juniperina. M. *S. V.* p. 198. n. 2.

Ibidem.

PLVMBAGO.

PLVMBAGO.

73. P. *zeylanica*, foliis petiolatis ouatis glabris, caulibus filiformibus. M. *S. V.* p. 199. n. 2.
Societatis insulae.

CONVOLVVLVS.

74. C. *Tuguriorum*, (volubilis) foliis cordato-sagittatis acutis: caule angulosо, pedunculis tetragonis vnifloris. F.
Noua Zeelandia.

75. C. *Turpethum*, foliis cordatis angulatis, caule membranaceo-quadrangulari, pedunculis multifloris. M. *S. V.* p. 201. n. 22. FORST. *pl. Esc.* 52.
Societatis et Amicorum insulae.

76. C. *grandiflorus?* (volubilis) foliis cordatis acutis rugosiusculis multineruiis: calycis foliolis subrotundis obtusissimis, pedunculis clauatis vnifloris. F.
C. grandiflorus? M. *S. V.* p. 201. n. 23.
Tanna.

77. C. *coelestis*, (volubilis) foliis cordatis acuminatissimis pubescentibus: pedunculis elongatis vmbellato-trifidis. F.
Tanna.

78. C. *peltatus*, foliis peltatis, pedunculis multifloris. M. *S. V.* p. 201. n. 27.
Societatis insulae.

79. C. *mucronatus*, (volubilis) foliis palmato-pedatis, lobis ciliatis apice mucronatis: pedunculis vnifloris. F.
Tanna.

80. C. *corymbosus*; foliis cordatis, pedunculis vmbellatis, caule repente. M. *S. V.* p. 203. n. 52.
Noua Caledonia.

81. C. *brasilienſis*, foliis emarginatis baſi biglandulosis: pedunculis trifloris. M. *S. V.* p. 204. n. 62.
Intra tropicos paſſim.

IPOMOEA.

82. I. *Bonanox*, foliis cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, floribus ternis, corollis indiuiſis. M. *S. V.* p. 204. n. 10.
Tanna.

83. I. *carnea*, foliis cordatis glabris: pedunculis multifloris, corollis marginatis. M. *S. V.* p. 205. n. 13.
Societatis inſulae.

CAMPANVLA.

84. C. *gracilis*, foliis lineari-lanceolatis obſolete ſerratis, caule dichotomo, floribus ſolitariis terminalibus. F.
Noua Zeelandia et Noua Caledonia.

NAVCLEA.

85. N. *orientalis*. M. *S. V.* p. 212.
Societatis inſulae.

PORTLANDIA.

86. P. *tetrandra*, floribus tetrandris, foliis obouatis. F.
P. tetrandra. M. *S. V.* p. 213. n. 1.
Inſula ferox (Savage iſland).

SCAEVOLA.

87. S. *Lobelia*. M. *S. V.* p. 213.
Tongatabu.

CINCHONA.

88. C. *corymbifera*, foliis oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus. FORST. in *act. Upſ. nov.* Vol. III. p. 176. M. *S. V.* p. 214. n. 3.

PSYCHOTRIA.

PSYCHOTRIA.

89. P. *ſpecioſa*, arborea, foliis oblongo-lanceolatis, inuolucro terminali ſubtrifloro. F.
Taheiti.

90. P. *aſiatica*, ſtipulis emarginatis, foliis lanceolato-ouatis. M. *S. V.* p. 214. n. 1.
Ibidem.

91. P. *herbacea*, caule herbaceo repente, foliis cordatis petiolatis. M. *S. V.* p. 214. n. 3.
Ibidem.

COFFEA.

92. C. *ſambucina*, foliis oblongo-lanceolatis acutis: cymis corymboſis terminalibus. F.
Inſulae Amicorum.

93. C. *opulina*, foliis ouato lanceolatis; cymis coarctatis globoſis terminalibus. F.
Noua Caledonia.

94. C. *odorata*, foliis ouatis acutis: cymis corymboſis axillaribus. F.
Tanna et Amicorum inſulae.

95. C. *triflora*, foliis ouato-lanceolatis acuminatis: pedunculis terminalibus ternis vnifloris. F.
Taheiti.

CHIOCOCCA.

96. C. *barbata*, erecta, foliis ouatis, pedunculis axillaribus vnifloris, corollis fauce barbatis. F.
Marchionis, Societatis et Amicorum inſulae.

BAEOBOTRYS.

97. B. *nemoralis*. FORST. *Charact. gen.* 11.
Tanna.

DENTELLA.

DENTELLA.

98. D. *repens*. FORST. *Charact. gen.* 13.
Noua Caledonia.

MORINDA.

99. M. *vmbellata*, erecta, foliis lanceolato-ouatis, pedunculis confertis. M. *S. V.* p. 217. n. 1.
Insulae Societatis.

100. M. *citrifolia*, arborea, pedunculis solitariis. M. *S. V.* p. 217. n. 2.
Societatis et Amicorum insulae.

ERITHALIS.

101. E. *polygama*, foliis obouatis: floribus axillaribus, masculis cymosis, hermaphroditis solitariis. F. *β*. Timonius. RUMPH. *Amb.* III. p. 216. t. 140. angustifolia.
Societatis insulae.

MVSSAENDA.

102. M. *frondosa*, panicula foliis coloratis. M. *S. V.* p. 218. n. 1.
Taheiti. Namoka.

GENIOSTOMA.

103. G. *rupestris*. FORST. *Charact. gen.* 12.
Tanna.

NICOTIANA.

104. N. *fruticosa*? foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, floribus acutis, caule frutescente. M. *S. V.* p. 221. n. 2.
Botanices insula prope nouam Caledoniam.

SOLANVM.

105. S. *repandum*, caule inermi subherbaceo flexuoso laeui, foliis ouatis repandis tomentosis, pedunculis axillaribus cymosis. F.
Marchionis et Societatis insulae.

106. S. *nigrum*, caule inermi herbaceo, foliis ouatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus. M. *S. V.* p. 223. n. 20.
Insula Paschatis.

107. S. *auiculare*, caule inermi fruticoso, foliis sinuato-pinnatifidis: corymbis terminalibus. F.
Noua Zeelandia.

CORDIA.

108. C. *Sebestena*, foliis oblongo-ouatis repandis scabris. M. *S. V.* p. 230. n. 3.
Societatis insulae.

109. C. *aspera*, foliis ouatis acuminatis asperis: floribus cymosis rugosis. F.
Tongatabu.

110. C. *dichotoma*, foliis oblongo-ouatis vix crenatis: corymbis dichotomis. F.
Noua Caledonia.

CARPODETVS.

111. C. *serratus*. FORST. *Charact. gen.* 17.
Noua Zeelandia.

CEANOTHVS.

112. C. *capsularis*, foliis ouato-cordatis, acuminatis serratis: capsulis triualuibus dehiscentibus. F.
Taheiti.

CELASTRVS.

CELASTRVS.

113. C. *crenatus*, inermis, foliis ouatis crenulatis: cymis axillaribus. F.
Marchionis insulae.

CORYNOCARPVS.

114. C. *laeuigata*. FORST. *Charact. gen.* 16. M. *S. V.* p. 242.
Noua Zeelandia.

ARGOPHYLLVM.

115. A. *nitidum*. FORST. *Charact. gen.* 15. M. *S. V.* p. 242.
Noua Caledonia.

ACHYRANTHES.

116. A. *aspera*, caule fruticoso erecto, calycibus reflexis spicae adpressis. M. *S. V.* p. 246. n. 1.
Passim intra tropicos.

GYNOPOGON.

117. G. *stellatum*, foliis verticillatis ternis lanceolatis FORST. *Charact. gen.* 18. n. 1.
Societatis et Amicorum insulae.

118. G. *Alyxia*, foliis verticillatis quinis obouatis. F.
Norfolciae insula.

119. G. *scandens*, foliis oppositis ouatis costatis. F.
Societatis insulae.

CERBERA.

120. C. *Manghas*, foliis lanceolatis, neruis transuersalibus. M. *S. V.* p. 251. n. 2.
Societatis insulae.

121. C. *paruiflora*, foliis stellatis obouatis. F.
Insulae Amicorum et Savage island.

GARDENIA.

122. G. *florida*, inermis, corollis obtusis, calyce angulato, foliis ouatis acutis. M. *S. V.* p. 251. n. 2.
Societatis et Amicorum insulae.

ECHITES.

123. E. *costata*, pedunculis cymosis, foliis ellipticolanceolatis acuminatis. F.
Kametti-valli. RHEED. *hort. malab.* P. IX. p. 23. t. 14.
Insulae Societatis.

TABERNAEMONTANA.

124. T. *citrifolia*, foliis oppositis ouatis, floribus lateralibus glomerato-vmbellatis. M. *S. V.* p. 255. n. 1.
Namoka.

DIGTNIA.

MELODINVS.

125. M. *scandens*. FORST. *Charact. gen.* 19. M. *S. V.* p. 256.
Noua Caledonia.

PERIPLOCA.

126. P. *capsularis*, foliis lanceolatis integerrimis oppositis: cymis axillaribus diffusis. F.
Noua Zeelandia.

CYNANCHVM.

127. C. *viminale*, caule volubili perenni aphyllo. M. *S. V.* p. 257. n. 1.
Botanices insula.

ASCLEPIAS.

ASCLEPIAS.

128. A. *volubilis*, arborea volubilis, foliis oppositis cordato-subrotundis integerrimis carnosis: umbellis simpliciſſimis erectis. F.
A. volubilis? M. *S. V.* p. 259. n. 4.
Nanſiera-patſia. RHEED. *hort. mal.* P. IX. p. 21. t. 13.
Numularia lactea maior. RUMPH. *amb.* V. t. 175. f. 1.
Tanna.

CHENOPODIUM.

129. C. *triandrum*, foliis cordato-ſagittatis, ſpicis terminalibus aphyllis interruptis. F.
Noua Zeelandia.

SALSOLA.

130. S. *Kali*, herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis ſcabris, calycibus marginatis axillaribus. M. *S. V.* p. 263. n. 1.
Botanices inſula.

131. S. *fruticoſa*, fruticoſa erecta, foliis filiformibus obtuſiuſculis. M. *S. V.* p. 263. n. 12.
Noua Zeelandia.

GENTIANA.

132. G. *ſaxoſa*, corollis quinquefidis campanulatis, foliis ſpatulatis. F. M. *S. V.* p. 268. n. 14.
Noua Zeelandia.

133. G. *montana*, corollis quinquefidis campanulatis, foliis cordatis ſeſſilibus. F.
Ibidem.

DICHONDRA.

134. D. *repens*. FORST. *Charact. gen.* 20.
Noua Zeelandia.

HYDROCOTYLE.

135. H. *moſchata*, foliis reniformibus ſeptemlobatis ſerratis villoſis: vmbellis multifloris. F.
Noua Zeelandia.

PEVCEDANVM.

136. P. *geniculatum*, foliis ſubrotundo-reniformibus crenatis. F.
Noua Zeelandia.

COPROSVRA.

137. C. *lucida*, pedunculis compoſitis. M. *S. V.* p. 274. n. 1. FORST. *Charact. gen.* 69. n. 2.
Noua Zeelandia.

138. C. *foetidiſſima*, floribus ſolitariis. M. *S. V.* p. 274. n. 2. FORST. *Charact. gen.* 69. n. 1.
Ibidem.

LASERPITIVM.

139. L. *Aciphylla*, caule vaginato, petiolis foliorum dilatatis, foliis digitatis linearibus elongatis mucronatis. M. *S. V.* p. 282. n. 14.
Aciphylla ſquarroſa. FORST. *Charact. gen.* 68.
Noua Zeelandia.

LIGVSTICVM.

140. L. *Gingidium*, foliis pinnatis, foliolis rhombeo-cordatis obliquis crenatis obtuſis. F.
Gingidium montanum. FORST. *Char. gen.* 21.
Noua Zeelandia.

APIVM.

141. A. *graueolens*, foliis caulinis cuneiformibus. M. *S. V.* p. 292. n. 2.
Noua Zeelandia.

TRIGTNIA.

RHVS.

142. R. *atrum*, foliis ſimplicibus, ouato-oblongis: floribus polygamis. F.
Noua Caledonia.

XYLOPHYLLA.

143. X. *longifolia*, foliis linearibus, ramis tetragonis. M. *S. V.* p. 296. n. 1.

PENTAGTNIA.

COMMERSONIA.

144. C. *echinata.* FORST. *Charact. gen.* 22. M. *S. V.* p. 300.
Societatis inſulae.

LINVM.

145. L. *monogynum*, foliis alternis lineari-lanceolatis trineruiis, caule ſuffruticoſo. F.
Noua Zeelandia.

POLTGTNIA.

SCHEFFLERA.

146. S. *digitata.* FORST. *Charact. gen.* 20.
Noua Zeelandia.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

CRINVM.

147. C. *asiaticum?* foliis carinatis. M. S. V. p. 318. n. 2.
Amicorum insulae.

ANTHERICVM.

148. A. *cirratum*, foliis lanceolatis planiusculis: scapo paniculato, filamentis barbatis bicirratis. F.
Noua Zeelandia.

149. A. *Adenanthera*, foliis lineari-ensiformibus basi connatis; glandula inter filamentum et antheram. F.
Noua Caledonia.

DRACAENA.

150. D. *indiuisa*, arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo (laterali?) composito. FORST. *pl. esculent.* 33.
Noua Zeelandia.

151. D. *australis*, arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo terminali erecto supradecomposito. F.
Ibidem.

152. D. *terminalis*, herbacea caulescens, foliis lanceolatis: racemo terminali decomposito. FORST. *pl. esculent.* 32.
D. terminalis. M. S. V. p. 334. n. 4.
Insulae Societatis.

PHORMIVM.

PHORMIVM.

153. P. *tenax*, foliis plurimis, inflorescentia ramosa. M. *S. V.* p. 336. n. 1. FORST. *Charact. gen.* 24.
Noua Zeelandia.

IVNCVS.

154. I. *campestris*, foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. M. *S. V.* p. 341. n. 19. γ
Societatis insulae.

ACHRAS.

155. A. *dissecta*, floribus confertis corollis octodecemfidis, foliis obouatis emarginato-retusis.
FORST. *pl. esc.* 13.
A. dissecta. M. *S. V.* p. 342. n. 3.
Manyl-Kara. RHEED. *hort. mal.* P. III. p. 53. t. 25.
Amicorum Insulae.

LORANTHVS.

156. L. *tetrapetalus*, pedunculis vnifloris subsolitariis, foliis ouatis obtusis subsessilibus. F.
L. tetrapetalus. M. *S. V.* p. 343. n. 1.
Noua Zeelandia.

157. L. *Stelis*, racemis trichotomis, pedunculis trigonis, floribus aequalibus. M. *S. V.* p. 344. n. 8.
Societatis insulae.

DIGTNIA,

GAHNIA.

158. G. *procera*, paniculis spicatis pluribus elongatis, flosculis hexandris. F.

G. procera. FORST. *Charact. gen.* 26. M. S. V. p. 345.
Noua Zeelandia.

159. G. *Schoenoides*, culmis flexuosis, paniculis compositis spicatis rigidis subsolitariis. F.
Taheiti.

CLASSIS

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

EPILOBIVM.

160. E. *glabellum*, foliis oblongis dentatis obtusis: imis oppositis, caule teretiusculo erecto. F. Noua Zeelandia.

161. E. *rotundifolium*, foliis oppositis subrotundis denticulatis. F.
Ibidem.

XIMENIA.

162. X. *elliptica*, caule inermi, foliis elliptico-lanceolatis: pedunculis multifloris. F.
Noua Caledonia.

SKINNERA.

163. S. *excorticata*. FORST. *Charact. gen.* 29.
Fuchsia excorticata. M. *S. V.* p. 361. n. 3.
Noua Zeelandia.

DODONAEA.

164. D. *viscosa*, foliis oblongis. M. *S. V.* p. 362. n. 1.
In Societatis insulis dioica.
In Noua Zeelandia hermaphrodita.

LAWSONIA.

165. L. *Acronychia*, inermis, foliis longe petiolatis cuneiformibus. M. *S. V.* p. 362. n. 2.
Acronychia laevis. FORST. *Charact. gen.* 27.
Noua Caledonia.

MELICOPE.

MELICOPE.

166. M. *ternata*. FORST. *Charact. gen.* 28.
Noua Zeelandia.

VACCINIVM.

167. V. *cereum*, pedunculis solitariis vnifloris: corollis quinquangulari-ouatis, foliis ouato-subrotundis ferratis. F.
Andromeda cerea. M. *S.V.* p. 406. n. 3.
Bacca, non capsula.
Taheiti.

DAPHNE.

168. D. *foetida*, glabra, floribus terminalibus congestis sessilibus: foliis oppositis petiolatis ouato-oblongis. M. *S.V.* p. 372. n. 15.
Societatis insulae.

169. D. *rotundifolia*, hirsuta, floribus terminalibus congestis sessilibus, foliis oppositis ellipticis subpetiolatis glabris. M. *S.V.* p. 372. n. 16.
Namoka.

PASSERINA.

170. P. *Gnidia*, diandra glaberrima, foliis lanceolatis acutis. M. *S.V.* p. 374. n. 1.
Banksia Gnidia. FORST. *Charact. gen.* 4. n. 1.
Noua Zeelandia.

171. P. *pilosa*, diandra pilosa, foliis linearibus obtusis. M. *S.V.* p. 374. n. 12.
Banksia tomentosa. FORST. *Charact. gen.* 4. n. 2.
Ibidem.

172. P. *prostrata*, diandra pilosa, foliis ouatis (carnosis F.). M. *S.V.* p. 374. n. 13.
Banksia prostrata. FORST. *Charact. gen.* 4. n. 3.
Ibidem.

DIGTNIA.

DIGYNIA.

WEINMANNIA.

173. W. *racemosa*, foliis simplicibus ouatis serratis petiolatis: racemis axillaribus solitariis. F.
W. racemosa. M. *S. V.* p. 376. n. 4.
Noua Zeelandia.

174. W. *paruiflora*, foliis simplicibus ouatis serratis subsessilibus: racemis terminalibus ternis quinisue. F.
Taheiti.

CODIA.

175. C. *montana*. FORST. *Charact. gen.* 30. M. *S. V.* p. 376.
Noua Caledonia.

TRIGYNIA.

COCCOLOBA.

176. C. *australis*, foliis cordato-ouatis acutis, floribus polygamis. F.
Noua Zeelandia.

CARDIOSPERMVM.

177. C. *Halicacabum*, foliis laeuibus. M. *S. V.* p. 380. n. 1.
Societatis insulae.

SAPINDVS.

178. S. *Saponaria*, foliis impari-pinnatis, caule inermi. M. *S. V.* p. 380. n. 1.
Insula Paschatis.

TETRAGYNIA.

TETRAGTNIA.

HALORAGIS.

179. H. *proſtrata*, foliis oblongis integerrimis mucronatis, fructibus globoſis. F.
H. proſtrata. M. *S. V.* p. 381. FORST. *Charact. gen* 31.
Botanices inſula.

180. H. *alata*, foliis ouato-lanceolatis ſerratis, fructibus pyramidatis tetragonis alatis. F. JACQ. *Miſc. Auſtr.* 2. p. 332. *Icon rarior.* tab. 26.
Cercodia erecta. MVRR. in *Comm. Gotting.* 1780. P. 3. t. 1.
Tetragonia iuaefolia. M. *S. V.* p. 467. n. 3.
Noua Zeelandia.

CLASSIS.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

CASSYTA.

181. C. *filiformis*, filiformis laxa. MURR. *S. V.* p. 384. n. 1.
Societatis et Amicorum insulae.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

182. S. *tomentosa*, foliis pinnatis, foliolis numerosis subrotundis tomentosis. M. *S. V.* p. 391. n. 2. Societatis insulae.

183. S. *tetraptera*, foliis pinnatis: foliolis numerosis obouatis emarginatis, leguminibus tetragonis, angulis membranaceis. M. *S. V.* p. 391. n. 7. Noua Zeelandia.

CASSIA.

184. C. *Sophera*, foliis decemiugis lanceolatis, glandula baseos oblonga. M. *S. V.* p. 394. n. 28. Tongatabu.

GVILANDINA.

185. G. *Bonduccella*, aculeata, pinnis oblongo-ouatis, foliolis aculeis geminis. M. *S. V.* p. 396. n. 2. Noua Zeelandia.

GVAIACVM.

186. G. *dubium*, foliis coniugatis oblongo-lanceolatis obtusis. F. Tongatabu.

ADENANTHERA.

187. A. *scandens*, foliis pinnatis biiugis, foliolis ouatis obliquis glabris, cirris terminalibus bifidis. F.
Mallicollo.

TRICHILIA.

188. T. *spectabilis*, foliis pinnatis, foliolis obouatis, racemis axillaribus compositis. F.
Noua Zeelandia.

189. T. *alliacea*, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis acutis: racemis axillaribus supradecompositis. F.
Namoka.

LIMONIA.

190. L. *minuta*, inermis, foliis pinnatis, racemis corymbosis terminalibus. F.
Amicorum Insulae.

191. L. *lucida*, inermis, foliis simplicibus, pedunculis axillaribus. F.
Mallicollo.

DAIS.

192. D. *disperma*, floribus octandris decandrisque, foliis ouato-lanceolatis, acuminatis, enerviis. F.
Tongatabu.

MELASTOMA.

193. M. *Malabathrica*, foliis integerrimis quinquenerviis lanceolatis ouatis scabris. *M. S. V.* p. 404 n. 10.
Societatis insulae.

194. M. *glabra*, foliis integerrimis trineruiis ellipti-co-lanceolatis ſcabris, calycibus circumſciſſis. F.
Ibidem.

ANDROMEDA.

195. A. *rupeſtris*, racemis ſimpliciſſimis bracteatis, corollis campanulatis, foliis alternis oblongis ſerrulatis. F.
A. rupeſtris. M. *S. V.* p. 407. n. 16.
Noua Zeelandia.

GAVLTHIERIA.

196. G. *antipoda*, foliis ſparſis ſubrotundis ſerrato-dentatis, caule fruticoſo diffuſo. F.
Noua Zeelandia.

INOCARPVS.

197. I. *edulis*. M. *S. V.* p. 408. FORST. *Charact. gen.* 33.
Societatis, Amicorum et nouarum Hebridum Inſulae.

PENTAGYNIA.

SPONDIAS.

198. S. *dulcis*, petiolis teretibus ſexiugis: foliolis ſerratis coſtatis. E.
Societatis inſulae.

SVRIANA.

199. S. *maritima*. M. *S. V.* p. 431.
Botanices inſula.

CLASSIS

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

BASSIA.

200. B. *obouata*, foliis obouatis: pedunculis congestis terminalibus vnifloris. F.
Tanna.

RHIZOPHORA.

201. R. *gymnorhiza*, foliis ouato-lanceolatis integerrimis: radice terrae superimposita. M. *S. V.* p. 442. n. 2.
Namoka.

202. R. *Mangle*, foliis acutis, fructibus subulato-clavatis. M. *S. V.* p. 442. n. 5.
Societatis, Amicorum, nouarum Hebridum insulae et noua Caledonia.

CRATAEVA.

203. C. *religiosa*; inermis, foliolis subaequalibus. FORST. *pl. esc.* 14.
Societatis insulae.

TRIVMFETTA.

204. T. *procumbens*, foliis subrotundo-cordatis subtrilobis tomentosis, caule procumbente. F.
Societatis insulae.

LYTHRVM.

205. L. *Pemphis*, fruticosum hirsutum, foliis oppositis oblongis integris, floribus axillaribus pedunculatis solitariis, capsula circumscissa vniloculari. M. *S. V.* p. 447. n. 11.
Pemphis acidula. FORST. *Charact. gen.* 34.
Teautea.

TRIGYNIA.

EVPHORBIA.

206. E. *origanoides*, dichotoma, foliis serrulatis ouatis obtusis trineruiis, panicula terminali, caulibus simplicibus. M. *S. V.* p. 449. n. 15.
Amicorum insulae.

207. E. *Atoto*, dichotoma, foliis ouatis integerrimis, vmbella terminali. F.
Societatis insulae.

208. E. *glauca*, vmbella subquinquefida, trifida, involucris et inuolucellis ouatis, foliis sparsis oblongo-lanceolatis integerrimis, caule frutescente. F.
Noua Zeelandia.

TACCA.

209. T. *pinnatifida*. FORST. *Charact. gen.* 35. *pl. esculent.* 28. M. *S. V.* p. 455.
Societatis Insulae.

CLASSIS

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

MELALEVCA.

210. M. *scoparia*, foliis alternis ouatis acutis subtrineruiis: floribus terminalibus solitariis, sessilibus. F. *pl. esc.* 53.
M. scoparia. M. *S. V.* p. 699. n. 4.
Leptospermum scoparium. FORST. *Char. gen.* 36. n. 6.
Noua Zeelandia.

211. M. *virgata*, foliis oppositis linearibus eneruiis, pedunculis axillaribus vmbelliferis. F.
M. virgata. M. *S V.* p. 699. n. 5.
Leptospermum virgatum. FORST. *Charact. gen.* 36. n. 7.
Noua Caledonia.

212. M. *perforata*, foliis oppositis ouali-subrotundis, pellucido punctatis, pedunculis axillaribus trifidis. F.
Leptospermum perforatum. FORST. *Charact. gen.* 36. n. 4.
Noua Zeelandia.

213. M. *diffusa*, foliis oppositis ouatis acuminatis: pedunculis rameis cymosis. F.
Ibidem.

214. M. *florida*, foliis oppositis oblongo-obouatis, venosis, pedunculis terminalibus cymosis, calycibus turbinatis. F.

Leptoſpermum ſcandens. FORST. *Charact. gen.* 36. n. 1.
Ibidem.

215. M. *aeſtuoſa*, foliis oppoſitis ouatis obouatisque venoſis (ſubtrineruiis), pedunculis cymoſis terminalibus tomentoſis. F.
Leptoſpermum collinum. FORST. *Charact. gen.* 36. n. 2.
Melaleuca lucida? M. *S. V.* p. 699. n. 2.
Societatis inſulae.

216. M. *lucida*, foliis oppoſitis lanceolatis vtrinque acuminatis aueniis eneruiis, floribus terminalibus congeſtis ſubſeſſilibus. F.
Noua Zeelandia.

217. M. *ciliata*, foliis ſparſis, ſuperioribus ſuboppoſitis oblongis obtuſis ciliatis aueniis eneruiis: cymis corymboſis terminalibus. F.
M. villoſa? M. *S. V.* p. 699. n. 3.
Leptoſpermum ciliatum. FORST. *Charact. gen.* 36. n. 3.
Noua Caledonia.

218. M. *Leucadendron*, polyadelpha, foliis alternis lanceolatis ſubfalcatis quinqueneruiis, ſpicis terminalibus elongatis. F.
M. Leucadendron. M. *S. V.* p. 698. n. 1. (*α* latifolia?)

Nomen *Melaleucae*, licet huic vltimae ſpeciei vnice congruum, adoptaui tamen, ne nomina multiplicarentur, ſed genus in locum naturalem reſtitui, cum, praeter M. Leucadendron, nulla ſpecies polyadelpha ſit.
Noua Caledonia.

PSIDIVM.

219. P. *decaſpermum*, foliis ouatis acuminatis pubeſcentibus; pedunculis vnifloris bracteatis. M. *S. V.* p. 461. n. 3.
Decaſpermum fruticoſum. FORST. *Charact. gen.* 37.
Societatis inſulae.

EVGENIA.

220. E. *malaccenſis*, foliis integerrimis, pedunculis ramoſis lateralibus. M. *S. V.* p. 461. n. 1. F. *pl. eſc.* 6.
Paſſim intra tropicos culta.

221. E. *racemoſa*, foliis crenatis, racemis longiſſimis, pomis ouatis quadranguliis. M. *S. V.* p. 461. n. 7.
Noua Caledonia.

TRIGTNIA.

SESVVIVM.

222. S. *Portulacaſtrum.* M. *S. V.* p. 465. n. 1.
Tongatabu.

PENTAGTNIA.

TETRAGONIA.

223. T. *halimifolia*, herbacea papuloſa, foliis elliptico-rhombeis petiolatis, pedunculis axillaribus vnifloris ſubſolitariis, fructu cornuto. F. T. expanſa? M. *S. V.* p. 467. n. 6.
Noua Zeelandia et Amicorum inſulae.

POLYGYNIA.

RVBVS.

224. R. *auſtralis*, fruticoſus dioicus, foliis ternatis quinato pinnatisque, caule petiolisque aculeatis, racemis axillaribus ſimplicibus. F. Noua Zeelandia.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CALOPHYLLVM.

225. C. *Inophyllum*, foliis oualibus. M. *S. V.* p. 491. n. 1.
Societatis insulae et noua Caledonia.

DICERA.

226. D. *dentata*, monogyna, foliis oblongis acuminatis dentatis, racemis simplicibus axillaribus laxis. F.
D. dentata. FORST. *Charact. gen.* 40. n. 1.
Noua Zeelandia.

227. D. *serrata*, tetragyna, foliis oppositis cordato-ouatis inaequaliter serratis: racemis lateralibus compositis. F.
D. serrata. FORST. *Charact. gen.* 40. n. 2.
Elaeocarpus Dicera. M. *S. V.* p. 494. n. 2.
Ibidem.

TRIGYNIA.

EVRYANDRA.

228. E. *scandens*. FORST. *Charact. gen.* 41.
Noua Caledonia.

POLYGYNIA.

WINTERA.

229. W. *axillaris*, pedunculis axillaribus congestis vnifloris, pistillis quatuor. F.
Drimys axillaris. FORST. *Charact. gen.* 42. n. 2. *Nov. Act. Upsal.* III. p. 182. LINN. *Suppl. pl.* p. 270.
Cur LINNEVS junior hanc monogynam fecit, non video.
Noua Zeelandia.

CLEMATIS.

230. C. *hexapetala*, foliis ternatis, foliolis cordato-ouatis crenato-incisis, pedunculis ramosis trichotomis diphyllis, floribus polypetalis dioicis. F.
C. hexapetala. M. *S. V.* p. 512. n. 6.
Noua Zeelandia.

231. C. *integrifolia*, foliis ternatis, foliolis ouatis integris mucronatis: pedunculis axillaribus paniculatis diphyllis. F.
Ibidem.

CLASSIS

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

TEVCRIVM.

232. T. *villosum*; foliis elliptico-ouatis acuminatis ferratis petiolatis villosis, racemo spicato terminali, calycibus inflatis. F.
Tongatabu.

OCYMVM.

233. O. *Scutellarioides*, corollis falcatis, pedicellis ramosis. M. *S. V.* p. 546. n. 15.
Tanna.

ANGIOSPERMIA.

EVPHRASIA.

234. E. *cuneata*, foliis subcuneiformibus incisis. F.
Noua Zeelandia.

ANTIRRHINVM.

235. A. *hexandrum*, foliis oppositis cordato-ouatis serratis: pedunculis axillaribus vnifloris. F.
Taheiti.

BESLERIA.

236. B. *biflora*, pedunculis bifloris, inuolucro caduco inflato, foliis ouatis integerrimis. F.
Cyrtandra biflora. FORST. *Charact. gen.* 3. n. 1.
Taheiti.

237. B. *cymoſa*, pedunculis cymoſis, pedicellis bracteolatis, foliis ouatis crenatis. F.
Cyrtandra cymoſa. FORST. *Charact. gen.* 3. n. 2.
Tanna.

MYOPORVM. *Solandr.*

Cal. 5. partitus. Cor. campanulata limbo patente ſubaequali 5 partito. Bacca 1 ſ. 2 ſperma, ſeminibus 2. locularibus.

238. M. *laetum*, foliis oblongis apice ſubſerratis laevibus glabris nitidis, corollis hirſutis. F.
Citharexylum perforatum. Mſpt.
Noua Zeelandia.

239. M. *pubeſcens*, foliis oblongo-ellipticis ſerratis pubeſcentibus. F.
Ibidem.

240. M. *craſſifolium*, foliis oblongis ſubſerratis carnoſis. F.
Botanices inſula.

241. M. *tenuifolium*, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corollis laeuibus. F.
Citharexylum tenuifolium. Mſpt.
Noua Caledonia.

RVELLIA.

242. R. *reptans*, foliis petiolatis ouatis obtuſis, obtuſe ſerratis, pedunculis terminalibus ſubſpicatis. F.
Tanna.

243. R. *fragrans*, foliis ſeſſilibus oblongis obtuſe ſerratis: floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. F.
Taheiti.

VOLKAMERIA.

244. V. *inermis*, ramis inermibus. M. *S. V.* p. 577. n. 2.
Paſſim intra tropicos.

VITEX.

245. V. *trifolia*, foliis ternatis quinatisque: foliolis ouatis acutis integerrimis ſubtus caneſcentibus, panicula rachi recta: pedicellis dichotomis. M. *S. V.* p. 579. n. 5.
Amicorum inſulae.

AVICENNIA.

246. A. *reſinifera*, foliis ouato-lanceolatis ſubtus tomentoſis. FORST. *pl. eſculent.* 44.
Noua Zeelandia.

ACANTHVS.

247. A. *ilicifolius*, foliis repandis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo aculeato. M. *S. V.* p. 580. n. 5.
Tanna, Noua Caledonia.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

LEPIDIVM.

248. L. *oleraceum*, foliis elliptico-oblongis acutis ferratis: floribus tetrandris. FORST. *pl. esc* 38.
Noua Zeelandia.

249. L. *Piscidium*, foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis: floribus tetradynamis. FORST. *pl. esculent.* 39.
Botanices insula, Teautea, Huaheine.

SILIQVOSA.

SISYMBRIVM.

250. S. *heterophyllum*, foliis pinnatis, foliolis reniformibus subtrilobis, infimis pinnatifidis, pilosis. F.
Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

WALTHERIA.

251. W. *indica*, foliis ouatis ſerratis plicatis: capitulis (ſub-)ſeſſilibus. M. *S. V.* p. 610. n. 3.

252. W. *Lophanthus*, foliis ſubrotundo-cordatis ſerratis ſericeo-tomentoſis petiolatis: capitulis pedunculatis imbricato-bractatis. F.
Lophanthus tomentoſus. FORST. *Charact. gen.* 14.
Marchionis inſulae.

MELOCHIA.

253. M. *odorata*, cymis corymboſis axillaribus, foliis cordatis acuminatis ſerratis. F.
M. odorata. M. *S. V.* p. 611. n. 7.
Tanna, Ea-uwa.

DECANDRIA.

PLAGIANTHUS.

254. P. *diuaricatus*. FORST. *Charact. gen.* 43.
Noua Zeelandia.

POLYANDRIA.

BARRINGTONIA.

255. B. *ſpecioſa*. FORST. *char. gen.* 38. M. *S. V.* p. 680.
Societatis et Amicorum inſulae.

SIDA

SIDA.

256. S. *rhombifolia*, foliis lanceolato-rhomboidalibus ferratis, axillis subspinosis. M. *S.V.* p. 621. n. 4.
Amicorum nouarumque Hebridum insulae.

257. S. *indica*, foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis multilocularibus scabris, calyce longioribus. M. *S.V.* p. 623. n. 24.
Tanna. Noua Caledonia.

URENA.

258. U. *lobata*, foliis angulatis. M. *S.V.* p. 627. n. 1.
Passim intra tropicos.

GOSSYPIVM.

259. G. *religiosum*, foliis trilobis acutis subtus vniglandulosis, ramulis nigropunctatis. M. *S.V.* p. 628. n. 4.
Societatis insulae.

HIBISCVS.

260. H. *bacciferus*, foliis cordatis integerrimis acuminatissimis, calyce exteriore triphyllo caduco, fructu baccato. F.
H. populneus? M. *S.V.* p. 629. n. 10.
Societatis et Amicorum insulae, etiam Paschatis insula.

261. H. *tiliaceus*, foliis cordatis subrotundis indiuisis acuminatis, crenatis, caule arboreo, calyce exteriore decemdentato. M. *S.V.* p. 629. n. 11. FORST. *pl. esc.* 45.
Passim intra tropicos.

262. H. *Rosasinensis*, foliis ouatis acuminatis ferratis, caule arboreo. M. *S.V.* p. 629. n. 13.
Ibidem.

263.

263. H. *Abelmoſchus*, foliis ſubpeltato-cordatis ſeptem-angularibus, caule hiſpido. M. *S. V.* p. 630. n. 26.
Societatis inſulae.

264. H. *eſculentus?* foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. M. *S. V.* p. 630. n. 27.
Ibidem.

265. H. *haſtatus*, foliis oblongis ſubhaſtato-trilobis integerrimis, pedunculis axillaribus terminalibusque ſubtrifidis: petalis laceris. F. H. haſtatus. M. *S. V.* p. 631. n. 33.
Ibidem.

CROSSOSTYLIS.

266. C. *biflora*. FORST. *Char. gen.* 44.
Inſulae Societatis.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

DECANDRIA.

ABRVS.

267. A. *precatorius*. M. *S.V.* p. 641. n. 1.
Societatis insulae.

ERYTHRINA.

268. E. *Corallodendron*, foliis ternatis inermibus, caule arboreo inermi. M. *S.V.* p. 642. n. 2. ♄.
Societatis insulae.

DOLICHOS.

269. D. *luteolus*, volubilis, leguminibus capitatis pluribus cylindricis, seminibus rotundatis. M. *S.V.* p. 657. n. 5.
Societatis insulae.

270. D. *pruriens*, volubilis, leguminibus racemosis, valvulis subcarinatis hirtis, pedunculis ternis? M. *S.V.* p. 657. n. 12.
Namoka.

GLYCINE.

271. G. *rosea*, volubilis, foliis ternatis, foliolis cordato-ovatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris: leguminibus compressis carinatis monospermis. F.
Insulae Societatis.

272. G. *lucida*, volubilis, foliis ternatis, foliolis ouatis acuminatis integerrimis, racemis terminalibus glandulosis, pedicellis ternis, leguminibus inflatis dispermis. F.
Ibidem.

AESCHYNOMENE.

273. A. *coccinea*, caule arboreo, foliis pinnatis, foliolis ouali-oblongis obtusis mucronatis, leguminibus subarcuato-filiformibus compressiusculis. F.
A. coccinea. M. *S. V.* p. 671. n. 3.
Toeri-Mera. RUMPH. *amb.* I. t. 77.
Differentia specifica A. grandiflorae emendanda, vt ab hac distinguatur.
Societatis insulae, Botanicesque insula.

HEDYSARVM.

274. H. *vmbellatum*, foliis ternatis, pedunculis vmbelliferis, caule fruticoso. M. *S. V.* p. 673. n. 22.
Tanna et noua Caledonia.

275. H. *heterocarpon*, foliis ternatis, floribus paniculato-spicatis, leguminibus articulatis, infimo monospermo, stipulis setaceis. M. *S. V.* p. 673. n. 24.
Societatis insulae.

276. H. *Lagopodioides*, foliis ternatis, racemis oblongis, leguminibus inflexis, calycibus hirsutis. M. *S. V.* p. 674. n. 40.
Noua Caledonia.

GALEGA.

277. G. *littoralis*, leguminibus racemosis, tota villoso-tomentosa. M. *S. V.* p. 679. n. 3.
Passim intra tropicos.

LOTVS.

278. L. *arboreus*, leguminibus quinatis, foliolis obcordatis, caule arboreo. F.
Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA.

CITRVS.

279. C. *Aurantium*, petiolis alatis, foliis acuminatis. M. *S. V.* p. 679. n. 2.
Tanna.

280. C. *decumana*, petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis. M. *S. V.* p. 679. n. 3.
Amicorum Insulae.

POLYANDRIA.

HYPERICVM.

281. H. *gramineum*, floribus trigynis, caule herbaceo tetragono dichotomo, foliis oblongo-paraboli cis.
Noua Caledonia.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

SONCHVS.

282. S. *oleraceus*, pedunculis tomentosis, calycibus glabris. M. *S. V.* p. 712. n. 5.
Noua Zeelandia et Amicorum insulae.

BIDENS.

283. B. *pilosa*, foliis pinnatis subpilosis, caule geniculis barbatis, calycibus inuolucro simplici, seminibus diuergentibus. M. *S. V.* p. 732. n. 7.
Tongatabu.

ADENOSTEMMA.

284. A. *viscosa*. FORST. *Charact. gen.* 45.
Verbesina Lavenia. M. *S. V.* p. 779. n. 4.
Societatis insulae.

AGERATVM.

285. A. *conyzoides*, foliis ouatis, caule piloso. M. *S. V.* p. 737. n. 1.
Tanna.

CHRYSOCOMA.

286. C. *purpurea*, herbacea, foliis elliptico-lanceolatis subserratis pubescentibus, panicula terminali corymbosa. F.
Tanna.

CALEA.

287. C. *leptophylla*, floribus terminalibus ternis quinisue congestis, foliis oblongis imbricatis integerrimis sessilibus, caule fruticoso. F.
Noua Zeelandia.

288. C. *pinifolia*, pedunculis terminalibus congestis, foliis linearibus acerosis, caule fruticoso. F.
Ibidem.

POLYGAMIA SVPERFLVA.

GNAPHALIVM.

289. G. *trinerue*, fruticosum, foliis sessilibus lanceolatis trineruiis subtus argenteis, panicula corymbosa terminali laxa. F.
Noua Zeelandia.

290. G. *lanatum*, herbaceum, lanatum, foliis linearioblongis apice calloso-mucronatis, corymbo coarctato, caule simpliciſſimo. F.
Ibidem.

291. G. *inuolucratum*, herbaceum, foliis linearibus elongatis mucronatis subtus tomentosis, capitulo terminali folioso. F.
Ibidem.

292. G. *luteo-album*, herbaceum, foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis vtrinque pubescentibus. M. *S. V.* p. 747. n. 32.
Noua Caledonia.

XERANTHEMVM.

293. X. *Bellidioides*, (receptaculo nudo, pappo piloso) ramis vnifloris, foliis ouato-oblongis cuspidatis amplexicaulibus, pedunculis tomentosis subaphyllis. F.
Noua Zeelandia.

CINERARIA.

294. C. *rotundifolia*, paniculis paucifloris, foliis petiolatis ouato-subrotundis integerrimis subtus tomentosis, caule arboreo. F.
Brachyglottis rotundifolia. FORST. *Charact. gen.* 46. n. 1.
Noua Zeelandia.

295. C. *repanda*, paniculis compositis racemosis diffusis, foliis petiolatis ouatis repando-sinuatis, subtus tomentosis, caule arboreo. F.
Brachyglottis repanda. FORST. *Charact. gen.* 46. n. 2.
Ibidem.

ASTER.

296. A. *holosericeus*, herbaceus, foliis oblongo-lanceolatis serratis subtus argenteo-sericeis, scapis vnifloris foliosis. F.
Noua Zeelandia.

297. A. *coriaceus*, herbaceus, foliis ouatis integerrimis superne sulcatis subtus lanatis, scapis vnifloris foliosis lanatis. F.
Ibidem.

SOLIDAGO.

298. S. *arborescens*, caule arboreo, paniculis corymbosis strictis terminalibus, foliis ouato-subrotundis acutis repandis petiolatis. F.
Noua Zeelandia.

ARNICA.

299. A. *oporina*, fruticosa, foliis lanceolatis callosocrenatis subtus tomentosis, pedunculis vnifloris solitariis terminalibus squamatis. F.
Noua Zeelandia.

COTVLA.

COTVLA.

300. C. *coronopifolia*, foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus dentatis, floribus floſculoſis. M. *S. V.* p. 774. n. 4.
Noua Zeelandia.

301. C. *minuta*, foliis alternis ſubamplexicaulibus oblongis dentatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus folio oppoſitis. F.
Noua Caledonia.

ECCLIPTA.

302. E. *proſtrata*, caule proſtrato, foliis ſubundulatis ſubpetiolatis. M. *S. V.* p. 779. n. 4.
Tanna.

SIGESBECKIA.

303. S. *orientalis*, petiolis ſeſſilibus, calycibus exterioribus linearibus maioribus patentibus. M. *S. V.* p. 779. n. 1.
Paſſim intra tropicos.

BVPHTHALMVM.

304. B. *Helianthoides*, foliis oppoſitis ouatis ferratis triplineruiis, calycibus folioſis, caule herbaceo. M. *S. V.* p. 781. n. 11.
Paſſim intra tropicos.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDVLA.

305. C. *pumila*, ſeminibus oblongis incuruatis, foliis orbiculatis crenato-ſerratis, ſerraturis mucronatis, ſcapo nudo vnifloro. F.
Noua Zeelandia.

POLYGAMIA SEGREGATA.

CRASPEDIA.

Calyculus nullus. Calyx communis imbricatus. Floſculorum faſciculi aliquot depreſſi, omnes hermaphroditi tubuloſi. Pappus plumoſus. Receptaculum paleaceum.

306. C. *vniflora.* F.
Noua Zeelandia.

MONOGAMIA.

SHAWIA.

307. S. *paniculata.* FORST. *Charact. gen.* 48.
Noua Zeelandia.

LOBELIA.

308. L. ***arborea***, caule arboreo, foliis petiolatis ouato-oblongis ferrato-dentatis, pedunculis axillaribus ſolitariis vniflоris. F.
Societatis Inſulae.

309. L. ***angulata***, caule proſtrato ſimpliciſſimo, foliis ſubrotundis repando-dentatis, pedunculis axillaribus ſolitariis vniflоris. F.
Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

OPHRYS.

310. O? *squamata*, bulbis fasciculatis, scapo elongato aphyllo spicato, foliis radicalibus imbricatis oblongis acutis carinatis, nectarii labio trifido barbato deflexo. F.
Noua Caledonia.

311. O. *unifolia*, bulbo ouato, scapo tereti vaginato, folio tereti fistuloso reflexo, in medio pro emittendo scapo perforato. F.
Noua Zeelandia.

SERAPIAS.

312. S. *regularis*, bulbis ouatis fibrosis, foliis vaginantibus ensiformibus carinatis, scapo erecto spicato, corollis hexapetalis. F.
Thelymitra longifolia. FORST. *Charact. gen.* 49.
Suasu b. SOLANDRI huc reduxi.
Noua Zeelandia.

EPIDENDRVM.

313. E. *tuberosum*? foliis lato-lanceolatis neruosis membranaceis, bulbo innatis, scapo vaginato, nectario cymbiformi bifido. M. *S.V.* p. 819. n. 25.
Noua Caledonia.

314. E. *triſte*, foliis teretibus cylindricis inanibus, vaginis fiſtuloſis, pedunculis oppoſitifoliis corymboſis vaginam perforantibus, nectarii labio integro ſpatulato cordiformi. F.
Ibidem.

315. E. *criſpatum*, foliis caulinis teretibus filiformibus ſubincuruis inanibus ſeſſilibus: racemo ſimpliciſſimo, nectarii labio lacinia media reuoluta, vndulato crenata. F.
Societatis inſulae.

316. E. *equitans*, foliis equitantibus enſiformi-compreſſis carinatis, acuminatis, ſcapo nudo, racemo ſpicato nutante filiformi. F.
Ibidem.

317. E. *Myoſurus*, foliis baſi vaginantibus oblique divaricatis linearibus obtuſis canaliculatis, ſcapo nudo, racemo ſpicato nutante filiformi. F.
Ibidem.

318. E. *biflorum*, foliis diſtichis, lineari lanceolatis acutis, pedunculis biflоris ſolitariis vaginas foliorum perforantibus, nectarii labio trifido acuminato. F.
Ibidem.

319. E. *autumnale*, foliis caulinis lanceolatis neruoſis confertis vaginantibus, pedunculis terminalibus ſquamatis paniculatis, nectarii labio erecto retuſo. F.
Noua Zeelandia.

320. E. *Faſciola*, foliis radicantibus paraſiticis faſcieulatis linearibus vndulatis, ſcapis pluribus racemoſis, nectarii labio calceiformi calcarato. F.
Societatis inſulae.

321. E. *vmbellatum*, ſtolonibus repentibus, foliis ouatis carnoſis petiolatis, petiolis infixis apophyſibus

physibus ouatis anguloso-carinatis, scapo radicato, vmbella simplici vnilaterali, petalis infimis elongatis. F.
Ibidem.

322. E. *resupinatum*, foliis caulinis petiolatis ouatis acuminatis integerrimis plicato carinatis quinqueneruiis, racemo simplici spicato, floribus resupinatis, nectarii labio inferiore dentato. F. Basaala-poulou-maravara. RHEED. *hort. mal.* Part. XII. tab. 27. bona.
Societatis insulae.

323. E. *Clypeolum*, folio radicali subrotundo-cordato, basi cucullato, apice reflexo acuto, scapo erectiusculo racemoso, nectarii labio inferiore orbiculato emarginato maximo. F.
Ibidem.

FORSTERA.

324. F. *sedifolia*. M. *S. V.* p. 819. n. 1. *Nov. Act. Upsal.* III. p. 184. t. 9.
Noua Zeelandia.

TRIANDRIA.

SISYRINCHIVM.

325. S. *Ixioides*, foliis ensiformibus conduplicatis longissimis, panicula trichotoma, petalis exterioribus dimidio minoribus. F.
Noua Zeelandia.

PENTANDRIA.

PENTANDRIA.

PASSIFLORA.

326. P. ***aurantia***, foliis trilobis, lobis parabolicis diſtantibus, medio productiore. F.
Noua Caledonia.

POLYANDRIA.

GREWIA.

327. G. ***Mallococca***, foliis cordatis ouato-oblongis crenatis ſcabris, pedicellis axillaribus trifloris, fructu tetracocco. M. *S. V.* p. 827. n. 4.
Malococca crenata. FORST. *Charact. gen.* 39. *Nov. Act. Upſ.* III. p. 185.
Societatis et Amicorum inſulae.

ARVM.

328. A. ***eſculentum***, acaule, foliis peltatis ouatis integerrimis baſi emarginatis. M. *S. V.* p. 827. n. 7. FORST. *pl. eſculent.* 26.
Paſſim intra tropicos et in Noua Zeelandia colitur.

329. A. ***macrorhizon***, acaule, foliis peltatis cordatis repandis baſi bipartitis. M. *S. V.* p. 827. n. 8. FORST. *pl. eſc* 27.
Arum indicum ſatiuum. RUMPH. *amb.* V. t. 106.
Ibidem.

DRACONTIVM.

330. D. ***polyphyllum***, ſcapo breuiſſimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis, laciniis pinnatifidis.

natifidis. M. *S. V.* p. 829. n. 1. FORST. *pl. esculent.* 29.
Societatis insulae planta culta.

331. D. *pertusum*, foliis pertusis, caule scandente.
M. *S. V.* p. 829. n. 5.
Tanna.

CLASSIS

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ARTOCARPVS.

332. A. *incisa*, foliis incisis. M. *S. V.* p. 838. n. 1. Monogr. mea *vom Brodbaum* 1784. 4. FORST. *pl. esc.* 1.
Passim intra tropicos culta.

BALANOPHORA.

333. B. *fungosa*. FORST. *Charact. gen.* 50.
Tanna.

CASVARINA.

334. C. *equisetifolia*, verticillis staminum approximatis. M. *S. V.* p. 840. n. 1.
Intra tropicos.

335. C. *nodiflora*, verticillis staminum remotis. M. *S. V.* p. 840. n. 2.
Noua Caledonia.

TRIANDRIA.

TYPHA.

336. T. *latifolia*, foliis ensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. M. *S. V.* p. 841. n. 1.
Noua Zeelandia.

COIX.

337. C. *Lacryma.* M. *S. V.* p. 842.
Tongatabu.

CAREX.

338. C. *vncinata*, ſpica ſimplici androgyna lineari ſuperne maſcula, ariſtis feminarum vncinatis, maſculis muticis. M. *S. V.* p. 843. n. 5.
Noua Zeelandia.

339. C. *lithoſperma*, ſpicis paniculatis maſculis, floribus femineis ſolitariis, ſeminibus globoſis nitidis. M. *S. V.* p. 846. n. 45.
Tanna.

HERNANDIA.

340. H. *ſonora*, foliis peltatis. M. *S. V.* p. 847. n. 1.
Societatis et Amicorum inſulae.

PHYLLANTHVS.

341. P. *virgata*, foliis ſimplicibus alternis linearibus mucronatis, pedunculis axillaribus ſolitariis vniflоris, caule fruticoſo. F.
Societatis inſulae.

TETRANDRIA.

URTICA.

342. U. *aeſtuans*, foliis alternis cordatis, racemis dichotomis, fructibus orbiculato-corymboſis. M. *S. V.* p. 850. n. 16.
Societatis inſulae.

343. U. *argentea*, foliis alternis elliptico-lanceolatis integris ſubtus glaucis: ſpicis axillaribus ſolitariis interruptis. F.
Ibidem.

344. U. *ruderalis*, foliis alternis cordato-ouatis obtuſe ſerratis, paniculis axillaribus diuaricato-corymboſis. F.
Ibidem.

345. U. *virgata*, foliis oppoſitis ouatis ſerratis trinerviis, ſpicis axillaribus ſolitariis interruptis. F.
Ibidem.

346. U. *ferox*, foliis oppoſitis haſtato-cordatis ſetoſo-ſerratis, racemis geminis diuaricatis, ſtipulis cordatis. F.
Noua Zeelandia.

MORVS.

347. M. *papyrifera*, foliis palmatis, fructibus hiſpidis M. *S. V.* p. 851. n. 3.
Culta intra tropicos paſſim, etiam in Noua Zeelandia borealiore.

PENTANDRIA.

AMARANTHVS.

348. A. *tricolor*, glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis ſeſſilibus, foliis lanceolatis acuminatis. M. *S. V.* p. 853. n. 4.
Societatis inſulae.

349. A. *gangeticus*, glomerulis triandris ſubſpicatis ouatis, foliis laoceolato-ouatis emarginatis. M. *S. V.* p. 853. n. 6.
Ibidem.

HEPTANDRIA.

GVETTARDA.

350. G. *ſpecioſa*. M. *S. V.* p. 855. n. 1.
Societatis inſulae.

MONADEI.

MONADELPHIA.

CVPRESSVS.

351. C. *columnaris*, foliis imbricatis ſubulatis ſulcatis, ſtrobilis cylindricis elongatis. F.
Noua Caledonia et Norfolciae inſula.

ACALYPHA.

352. A. *virgata*, ſpicis femineis inuolucris cordatis ſerrátis, maſculis diſtinctis aphyllis, foliis lanceolatis ouatis. M. *S. V.* p. 862. n. 2.
Tanna.

CROTON.

353. C. *variegatum*, foliis lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis. M. *S. V.* p. 863. n. 1.
Mallicollo et Tanna.

354. C. *nutans*, foliis rhombeo-ſubrotundis acuminatis vndulátis glabris nutantibus. F.
Societatis, Amicorum et nouarum Hebridum Inſulae.

355. C. *Inophyllum*, foliis obouatis integerrimis, caule arboreo. F.
Noua Caledonia.

RICINVS.

356. R. *Mappa*, foliis peltatis indiuiſis. M. *S. V.* p. 866. n. 4.
Tanna.

357. R. *dioicus*, foliis cordatis acuminatis. F.
Ibidem.

STERCVLIA.

358. S. *Balanghas*, foliis ouatis integerrimis petiolatis floribus paniculatis. M. *S. V.* p. 866. n. 1. FORST. *pl. esculent.* 22.
Tanna.

359. S. *foetida*, foliis digitatis. M. *S. V.* p. 866. n. 2. FORST. *pl. esc.* 23.
Ibidem.

ALEVRITES.

360. A. *triloba.* FORST. *Charact. gen.* 56.
Insulae Societatis.

SYNGENESIA.

GLOCHIDION.

361. G. *ramiflorum.* FORST. *Charact. gen.* 57.
Societatis insulae et nouae Hebrides.

CVCVRBITA.

362. C. *lagenaria*, foliis subangulatis tomentosis, basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. M. *S. V.* p. 868. n. 1.
Intra tropicos et in Paschatis insula.

SICYOS.

363. S. *angulata*, foliis angulatis. M. *S. V.* p. 870. n. 1.
Noua Zeelandia.

CLASSIS

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

ASCARINA.

364. A. *polystachya*. FORST. *Charact. gen.* 59.
Societatis insulae.

PANDANVS.

365. P. *odoratissima*. M. *S. V.* p. 878.
Athrodactylis spinosa. FORST. *Charact. gen.* 75.
Passim intra tropicos.

TRIANDRIA.

MABA.

366. M. *elliptica*. FORST. *Charact. gen.* 61. M. *S. V.* p. 881.
Amicorum insulae.

RESTIO.

367. R. *simplex*, culmis simplicibus, spica terminali. M. *S. V.* p. 882. n. 6.
Noua Zeelandia.

EXCOECARIA.

368. E. *Agallocha*. M. *S. V.* p. 882.
Tongatabu.

TETRANDRIA.

VISCVM.

369. V. *opuntioides*, caule prolifero ramosissimo aphyllo compresso. M. *S.V.* p. 883. n. 4.
Societatis insulae.

370. V. *antarcticum*, foliis ouatis integerrimis, racemis rameis terminalibusque articulatis. F.
Noua Zeelandia.

PENTANDRIA.

MELICYTVS.

371. M. *ramiflorus*. FORST. *Charact. gen.* 62.
Noua Zeelandia.

HEXANDRIA.

SMILAX.

372. S. *Ripogonum*, caule inermi tereti radicante, foliis ouato-lanceolatis acuminatis quinqueneruiis, floribus hermaphroditis. F.
Ripogonum scandens. FORST. *Charact. gen.* 25.
Noua Zeelandia.

373. S. *purpurata*, caule inermi tereti dichotomo, foliis cordato-ouatis acuminatis vnguiculatis integerrimis quinqueneruiis, pedunculis axillaribus vmbelliferis. F.
Noua Caledonia.

DIOSCOREA.

374. D. *pentaphylla*, foliis digitatis. M. *S.V.* p. 888. n. 1.
Societatis insulae.

375. D. *alata*, foliis cordatis, caule alato bulbifero. M. *S. V.* p. 888. n. 5.
Paſſim culta.

376. D. *bulbifera*, foliis cordatis, caule laeui bulbifero. M. *S. V.* p. 888. n. 6.
Societatis et Marchionis inſulae.

DECANDRIA.

CORIARIA.

377. C. *ſarmentoſa*, procumbens diffuſa, foliis cordato-ouatis acuminatis integerrimis quinqueneruiis ſubpetiolatis: racemis axillaribus elongatis nutantibus. F.
Noua Zeelandia.

DODECANDRIA.

MENISPERMVM.

378. M. *japonicum*, foliis peltatis rotundato-ouatis integris. M. *S. V.* p. 892. n. 3. THVNB. *flor. japon.* p. 193.
Inſulae Societatis.

POLYANDRIA.

HEDYCARYA.

379. H. *dentata*. FORST. *Char. gen.* M. *S. V.* p. 894.
Noua Zeelandia.

XYLOSMA.

380. X. *ſuaueolens*, foliis ouatis ſerratis. F.
Myroxylon ſuaueolens. FORST. *Charact. gen.* 63. n. 1.
Nomen mutaui, ne confundatur cum Myroxylo M. *S. V.* p. 395. quod Balſamum peruuianum fundit.
Inſulae Societatis.

381. X. *orbiculatum*, foliis ſubrotundis integerrimis. F.
Myroxylon orbiculatum. FORST. *Charact. gen.* 63. n. 2.
Savage iſland.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

MVSA.

382. M. *paradisiaca*, ſpadice nutante. M. *S. V.* p. 902. n. 1.
Paſſim intra tropicos culta.

ISCHAEMVM.

383. I. *muticum*, ſeminibus muticis. M. *S. V.* p. 906. n. 1.
Tanna.

384. I. *murinum*, ſpica bipartita: calyce ſeminibusque ariſtatis. FORST. *Nov. Act. Upſ.* III. p. 185.
Ibidem.

385. I. *inuolutum*, ſpica ſecunda mutica quadriflora, inuoluta receptaculo foliaceo concauo. F.
Societatis inſulae et paſſim intra tropicos.

CENCHRVS.

386. C. *echinatus*, ſpica oblonga conglomerata. M. *S. V.* p. 907. n. 5.
Societatis inſulae.

PARIETARIA.

387. P. *debilis*, foliis alternis ouatis petiolatis integerrimis ſubpiloſis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris, caule erectiuſculo. F.
Noua Zeelandia.

TERMINALIA.

388. T. *Catappa*, foliis obouatis, ſubtus tomentoſis. M. S. V. p. 910. n. 1.
Tanna.

389. T. *glabrata*, foliis obouatis vtrinque glabris. FORST. *pl. eſc.* 20.
Societatis et Amicorum inſulae.

CLVSIA.

390. G. *pedicellata*, foliis oppoſitis obouatis integerrimis venoſis, cymis axillaribus, floribus tetrapetalis. F.
Noua Caledonia.

391. C. *ſeſſilis*, foliis oppoſitis obouatis ellipticisque integerrimis venoſis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus tetrapetalis. F.
Tongatabu.

POMETIA.

392. P. *pinnata*, foliis pinnatis, racemo ſupradecompoſito terminali. F.
P. pinnata. FORST. *Charact. gen.* 55.
Tanna, Namoka.

393. P. *ternata*, foliis ternatis, racemis ſimpliciuſculis axillaribus. F.
Aporetica ternata. FORST. *Charact. gen.* 66.
Noua Caledonia.

CELTIS.

394. C. *orientalis*, foliis oblique cordatis ſubtus villoſis. M. S. V. p. 912. n. 3.
Societatis Inſulae.

MIMOSA.

MIMOSA.

395. M. *Mangium*, inermis arborea, foliis ouatis integerrimis neruosis obtusis: spicis globosis pedunculatis. L.
M. simplicifolia. M. *S. V.* p. 913. n. 1.
Mangium montanum. RUMPH. *amb.* III. t. 81.
Insulae Amicorum, nouae Hebrides, noua Caledonia.

DIOECIA.

PENNANTIA.

396. P. *corymbosa*. FORST. *Charact. gen.* 67.
Noua Zeelandia.

PISONIA.

397. P. *inermis*, caule inermi. M. *S. V.* p. 920. n. 2.
Societatis insulae.

PANAX.

398. P. *arboreum*, foliis quinatis obouatis serratodentatis, vmbellis compositis. F.
P. arborea. M. *S. V.* p. 920. n. 4.
Noua Zeelandia.

399. P. *simplex*, foliis alternis lanceolatis serratis, vmbellis compositis. F.
Ibidem.

BREYNIA.

400. B. *disticha*. FORST. *Charact. gen.* 73.
Noua Caledonia, Tanna.

GRISELINIA.

401. G. *lucida*. F.
Scopolia lucida. FORST. *Charact. gen.* 70.
Noua Zeelandia.

TRIOECIA.

TRIOECIA.

FICVS.

402. F. *religiosa*, foliis cordato ouatis integerrimis acuminatissimis, transuerse striatis: fructibus geminis globosis sessilibus calyculatis. F. F. religiosa. M. *S. V.* p. 921. n. 4.
Tanna.

403. F. *scabra*, foliis cordato-ouatis obliquis integris subtus scabris; fructibus turbinatis ecalyculatis. F.
Tanna, Namoka.

404. F. *aspera*, foliis oblique cordatis sinuato-dentatis vtrinque asperis: fructibus turbinatis, calycis margine obsoleto adnato. FORST. *pl. esculent.* 7.
Tanna.

405. F. *tinctoria*, foliis oblique ouatis obtusis, fructibus turbinatis basi calyculatis. F.
Societatis insulae.

406. F. *indica?* foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, pedunculis aggregatis, ramis radicantibus. M. *S. V.* p. 922. n. 7. FORST. *pl. esc.* 9.
Insulae Amicorum, nouarum Hebridum, noua Caledonia.

407. F. *septica*, foliis obliquis oblongo-ouatis acuminatis: pedunculis geminis apice calyculatis, fructibus verrucosis. F.
Tanna.

408. F. *Granatum*, foliis ouatis integerrimis, pedunculis terminalibus geminis horizontaliter divergentibus, fructibus calyculatis globosis. FORST. *pl. esculent.* 8.
Ibidem.

409. F. *obliqua*, foliis lanceolatis glaberrimis margine cartilagineis: pedunculis geminis breuiſſimis, calycibus caducis longitudine fructus. F.
Namoka, Tanna.

410. F. *prolixa*, foliis lanceolato-oblongis acuminatis ſubtus punctatis: pedunculis geminis apice calyculatis. F.
Societatis inſulae.

CLASSIS

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

CYCAS.

411. C. *circinalis*, frondibus pinnatis, foliolis linearibus planis. M. *S. V.* p. 925. n. 1.
Amicorum et nouarum Hebridum Insulae.

OPHIOGLOSSVM.

412. O. *scandens*, caule flexuoso tereti, frondibus coniugatis pinnatis, foliolis vtrinque spiciferis. M. *S. V.* p. 926. n. 7.
Passim intra tropicos.

OSMVNDA.

413. O. *discolor* ****, frondibus pinnatis, pinnis oblongis acutiusculis integris sessilibus alternis approximatis. F.
Noua Zeelandia.

414. O. *procera* ****, frondibus pinnatis, pinnis remotis ouato-oblongis acuminatis serratis sessilibus. F.
Ibidem.

ACROSTICHVM.

415. A. *dichotomum*, nudum dichotomum, spicis secundis adscendentibus reflexis. M. *S. V.* p. 929. n. 12.
Societatis insulae.

416. A. *aureum*, fronde pinnata: pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. M. *S. V.* p. 929. n. 16.
Ibidem.

PTERIS.

417. P. *pedata*, frondibus quinquangulis trifoliatis, pinnis pinnatifidis: lateralibus bipartitis. M. *S. V.* p. 931. n. 15.
Insulae Societatis.

418. P. *esculenta*, frondibus supradecompositis sulcatis, foliolis pinnatis, pinnis linearibus decurrentibus, summis breuioribus. FORST. *pl. esculent.* 47.
Ibidem.

419. P. *comans*, frondibus pinnatis: foliolis pinnatifidis, pinnis elongatis lanceolatis, apice attenuatis serratis. F.
Noua Zeelandia.

420. P. *rotundifolia*, frondibus pinnatis hispidis: pinnis suboppositis subrotundis, obsolete crenatis. F.
Ibidem.

421. P. *humilis*, frondibus subbipinnatis: foliolis oblongis incisis subpinnatis, extimis obsolete crenatis confluentibus. F.

BLECHNVM.

422. B. *orientale*, frondibus pinnatis: pinnis linearibus alternis. M. *S. V.* p. 931. n. 2.
Societatis insulae.

HEMIONITIS.

423. H. *reticulata*, frondibus lanceolato-falcatis integerrimis, venis reticulatis. F.
Societatis insulae.

LONCHITIS.

LONCHITIS.

424. L. *tenuifolia*, arboreſcens, frondibus decompoſitis, foliis pinnatis: pinnis lineari oblongis ſerratis, infimis pinnatifidis. F.
Tanna.

ASPLENIVM.

425. A. *Nidus*; frondibus ſimplicibus lanceolatis integerrimis glabris. M. *S. V.* p. 933. n. 4.
Societatis inſulae.

426. A. *flaccidum*, frondibus pinnatis: foliolis alternis remotis pinnatifidis, ſegmentis linearibus ſtrictis. F.
Noua Zeelandia.

427. A. *lucidum*, frondibus pinnatis: foliolis oppoſitis oblongo-ouatis acuminatis ſerrulatis. F.
Ibidem.

428. A. *polyodon*, frondibus pinnatis: foliolis trapezoidibus acuminatis acutis duplicato-ſerratis. F.

429. A. *obliquum*, frondibus pinnatis, ſtipitibus ſquamuloſis: foliolis oblongis oppoſitis acuminatis ſerratis, margine exteriore breuiore. F.
Noua Zeelandia.

430. A. *obtuſatum*, frondibus pinnatis: foliolis oppoſitis oblongis obtuſis ſerratis. F.
Ibidem.

431. A. *tenerum*, frondibus pinnatis: foliolis rhombeo-oblongis, obtuſis inciſo-ſerratis. F.

432. A. *caudatum*, frondibus pinnatis: foliolis pinnatifidis linearibus apice ſetaceis, ſegmentis obtuſis apice inciſo-ſerratis, ſtipite hirto. F.

433. A. *bulbiferum*, frondibus ſubbipinnatis, foliolis decurrentibus oblongis obtuſis pinnatifidis, fructificationibus proliferis. F.
Noua Zeelandia.

POLYPODIVM.

434. P. *Acroſtichoides*, frondibus linearibus integris glabris, fructificationibus confertis. F.
Societatis inſulae.

435. P. *ſerpens*, frondibus linearibus obtuſis pubeſcentibus, fructificationibus ſerialibus, ſtolonibus repentibus. F.
Noua Zeelandia.

436. P. *puſtulatum*, frondibus pinnatifidis laeuibus, pinnis oblongis integris acuminatis. F.

437. P. *ſcandens*, frondibus pinnatifidis laeuibus: pinnis linearibus obtuſis vndulatis diſtantibus, ſtolonibus radicantibus ſcandentibus. F.
Societatis inſulae.

438. P. *euectum*, frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis oblongis apice lineari-acuminatis ſerratis, fructificationum ſerie ſubmarginali continua. F.
Ibidem.

439. P. *hirſutulum*, frondibus pinnatis: pinnis oblongis obtuſe ſerratis, baſi ſurſum auriculatis, ſtipite villoſo. F.

440. P. *tenellum*, frondibus pinnatis: foliolis alternis remotis linearibus acuminatis vndulatis. F.

441. P. *diſſectum*, frondibus pinnatis: foliolis pinnatifidis, pinnulis oblongis obtuſe ſerratis, inferioribus longioribus vix coalitis. F.

442. P. *nymphale*, frondibus pinnatis pubeſcentibus: foliolis linearibus acuminatiſſimis ſerratis, baſi pinnatifidis: ſegmentis oblongis obtuſis vix antrorſum falcatis. F.
Noua Zeelandia.

443. P. *inuiſum*, frondibus pinnatis glabris: foliolis linearibus acuminatiſſimis ſerrato-pinnatis: pinnis

pinnis lanceolatis falcato-acutis, basi connatis. F.
Ibidem.

444. P. *pennigerum*, frondibus pinnatis glabris: foliolis linearibus acuminatissimis subpinnatis: pinnis ouato-oblongis obtusis connatis. F.
Ibidem.

445. P. *vestitum*, frondibus subbipinnatis: pinnis rhombeo-ouatis acutis inciso-serratis, infimis lobatis subpinnatis, stipite squamis scariosis vestito. F.

446. P. *nudum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis: pinnis rhombeis inciso-crenatis, stipite scabro nudo. F.

447. P. *setosum*, frondibus bipinnatis: foliolis subpinnatis: pinnis linearibus inciso-serratis, serraturis setaceis, stipite villoso. F.

448. P. *aristatum*, frondibus bipinnatis: foliolis inferioribus pinnatis: pinnis rhombeo-oblongis incisis, segmentis mucronato-serratis, stipite villoliúsculo. F.

449. P. *adiantiforme*, frondibus subbipinnatis: foliolis ouatis incisis, lobis ouatis obtusis crenato-serratis, infimis discretis, stipite squamuloso aspero. F.

450. P. *dichotomum*, frondibus dichotomis bipinnatis: pinnulis linearibus integris parallelis. M. *S. V.* p. 938. n. 66. FORST. *pl. esc* 49.
Societatis insulae et Noua Zeelandia.

451. P. *arboreum?* frondibus bipinnatis serratis, caudice arboreo inermi. M. *S. V.* p. 938. n. 67.
Ibidem.

452. P. *medullare*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis acuminatissimis: pinnis oblongis subfalcatis

falcatis acutis crenatis, ſtipite aſpero, caudice arboreo hiſpido. FORST. *pl. eſc.* 48.
Noua Zeelandia.

453. P. *extenſum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis acuminatis apice ferratis: pinnis oblongis ferratis, ſtipite punctis aſpero, caudice arboreo. F.

454. P. *dealbatum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis acuminatis ſubtus albis: pinnis oblongis ſubfalcatis ferratis: ſtipite aſpero, caudice arboreo. F.
Noua Zeelandia.

455. P. *affine*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis acuminatis: pinnis lineari-oblongis, crenatis, ſtipite glabro. F.

456. P. *lunulatum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis apice ferratis ſetaceis, pinnis lineari-oblongis falcatis apice ferrulatis, ſtipite aſpero. F.

457. P. *latifolium*, frondibus ſubbipinnatis: foliolis ouatis acuminatis pinnatifidis lobatisque: laciniis repandis crenatis, ſtipite glaberrimo nitido. F.

ADIANTVM.

458. A. *pedatum*, frondibus pedatis: foliolis pinnatis: pinnis antice gibbis inciſis fructificantibus. M. *S. V.* p. 939. n. 5.
Societatis inſulae.

459. A. *clauatum*, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis alternis: pinnis cuneiformibus integerrimis alternis vnifloris. M. *S. V.* p. 940. n. 22.

460. A. *trapeziforme*, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis alternis: pinnis rhombeis inciſis vtrinque fructificantibus. *M. S. V.* p. 940. n. 24?
Noua Zeelandia et intra tropicos.

461. A. *cuneatum*, frondibus pinnatis: foliolis oppoſitis ſubpinnatis: pinnis cuneiformibus retuſis alternis. F.

TRICHOMANES.

462. T. *reniforme*, frondibus ſimplicibus reniformibus ſtipitatis multifloris, receptaculis feminum exſertis cylindricis. F.
Noua Zeelandia.

463. T. *contiguum*, frondibus pinnatis: pinnis linearibus alternis approximatis integris, fructificantibus apice inciſis. F.

464. T. *humile*, frondibus pinnatifidis dichotomis: pinnis alternis decurrentibus linearibus obtuſis integris, fructificationibus turbinato-infundibuliformibus, ſtylis ſetaceis exſertis, ſtipite vix vllo. F.
Societatis inſulae.

465. T. *ſanguinolentum*, frondibus ſubbipinnatis, foliolis alternis pinnatifidis: pinnis dichotomis lineari-oblongis obtuſis integris decurrentibus: fructificationibus ouato-ſubrotundis dehiſcentibus. F.
Noua Zeelandia.

466. T. *biualue*, frondibus ſubbipinnatis: pinnis alternis decurrentibus dichotomis, ſegmentis linearibus ſerratis, fructificationibus ſubrotundis biualuibus. F.

467. T. *dilatatum*, frondibus ſubbipinnatis: pinnis alternis dichotomis decurrentibus cuneiformibus inciſis, fructificationibus biualuibus orbicularibus inflatis. F.

468. T. *demiſſum*, frondibus bipinnatis: foliolis alternis ſtrictis pinnatis: pinnis pinnatifido-dichotomis, ſegmentis linearibus obtuſis integris: fructificationibus globoſis terminalibus. F.

469. T. *cuneiforme*, frondibus bipinnatis: foliolis alternis dichotomis pinnatis: pinnis alternis cuneiformibus inciſis, fructificationibus truncato-laceris. F.

470. T. *gibberoſum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis: pinnis oblongis pinnatifido-inciſis, ſegmentis linearibus integris, margine interiore infra apicem fructificantibus. F.

471. T. *epiphyllum*, frondibus bipinnatis: foliolis pinnatis acuminatis: pinnis linearibus inciſo-ſerratis: fructificationibus in pagina ſuperiore infra apicem inciſurarum ſquamaceis. F.

472. T. *flaccidum*, frondibus decompoſitis: foliolis rhombeis ſubpinnatis: pinnis cuneiformibus apice inciſis margine interiore infra apicem fructificantibus. F.

473. T. *multifidum*, frondibus decompoſitis: foliolis alternis pinnatis: pinnis dichotomis linearibus decurrentibus argute ſerratis: fructificationibus ouato-ſubrotundis dehiſcentibus. F.

474. T. *elatum*, frondibus decompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis oblongis ſtrictis pinnatifido-inciſis, ſegmentis oblongis apice ſerratis, fructificationibus terminalibus ouatis. F.

475. T. *ſolidum*, frondibus decompoſitis: foliolis acuminatis: pinnis ouato-oblongis inciſis crenatis: fructificationibus filiformibus tubuloſis. F.

476. T. *ſquarroſum*, frondibus ſubbipinnatis: foliolis oblongis acuminatis ſubpinnatis ſerratis, ſerraturis mucronatis: fructificationibus ſimum globoſis dehiſcentibus ſubbiualuibus, ſtipite hiſpido barbato, caudice arboreo. F.

MVSCI.

LYCOPODIVM.

477. L. *nudum*, foliis ſubnullis, ſpicis dichotomis: floribus diſtantibus. M. *S. V.* p. 942. n. 2.
Societatis inſulae.

478. L. *Phlegmaria*, foliis verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis. M. *S. V.* p. 942. n. 2.
Ibidem.

479. L. *ſquarroſum*, foliis ſparſis linearibus glabris, ſpicis terminalibus folioſis. F.

480. L. *cernuum*, foliis ſparſis curuatis, caule ramoſiſſimo, ſpicis nutantibus. M. *S. V.* p. 943. n. 12.

481. L. *complanatum*, foliis bifariis connatis, ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. M. *S. V.* p. 943. n. 18.

482. L. *volubile* foliis bifariis diſtichis falcatis acuminatis. caule volubili ramoſo hiſpido, pedunculis ramoſis, ſpicis aggregatis nudis. F.

483. L. *flabellatum*, foliis bifariis: ſuperficialibus diſtichis, caule erecto tereti. M. *S. V.* p. 943. n. 23.

484. L. *ſcarioſum*, foliis bifariis imbricatis erectis ouatis glabris, ſpicis terminalibus ſquamoſis, ſquamis ſcarioſis reflexis. F.

485. L. *myrtifolium*, foliis quadrifariis lineari-oblongis, ſpicis terminalibus filiformibus folioſis. F.

APPENDIX.

PALMAE.

CORYPHA.

486. C. *umbraculifera*, frondibus pinnato-palmatis plicatis filoque interiectis, ſtipitibus ciliato-ſpinoſis. M. *S. V.* p. 984. n. 1.
Marchionis et Amicorum inſulae.

COCOS.

487. C. *nucifera*, inermis, frondibus pinnatis: foliolis replicatis enſiformibus. M. *S. V.* p. 985. n. 1.
Paſſim intra tropicos.

ARECA.

488. A. *oleracea??* foliolis integerrimis. M. *S. V.* p. 986. n. 2.
Nouae Hebrides; forte ad A. ſapidam referenda.

PLANTAE OBSCVRAE. †)

I.

489. *Salicornia auſtralis.* S. Noua Zeelandia.

†) Hoc titulo colliguntur plantae in Auſtraſiae inſulis a nobis quidem lectae, ſed vel imperfecte, vel omnino, deficientibus floribus et fructificationibus, non deſcriptae. Nomina nonnullis deinde adiecta iuxta ſententiam b. Solandri, qui easdem olim deſcripſerat.

II.

490. *Iasminum.* Noua Caledonia.

III.

491. *Schoenus arundinaceus.* S. Noua Caledonia.
492. *Schoenus surinamensis.* S. Taheiti.
493. *Schoenus rubiginosus.* S. Noua Zeelandia.
494. *Schoenus eleuatus.* S. Societatis insulae.
495. *Cyperus venustus.* S. Ibidem.
496. *Cyperus stuppeus.* S. Ibidem.
497. *Cyperus linctus.* S. Ibidem.
498. *Poa caespitosa.* Noua Zeelandia.
499. *Poa imbecilla.* S. Ibidem.

IV.

500. *Galium umbrosum.* S. Noua Zeelandia.
501. *Nertera depressa.* S. Ibidem.

V.

502. *Menyanthes.* Hort. Malab. Part. XI. t. 29. Noua Caledonia.
503. *Conuolvulus chrysorrhizus.* S. FORST. *pl. esculent.* 24. Passim cultus.
504. *Scaeuola sericea.* Botanices insula ad nouam Caledoniam.
505. *Scaeuola saligna.* Noua Caledonia.
506. *Physalis flaccida.* S. Societatis Insulae.
507. *Solanum viride.* S. FORST. *pl. esculent.* 42. Ibidem.
508. *Solanum astroites.* Ibidem.
509. *Rhamnus polifolius.* S. Noua Zeelandia.

510. *Rhamnus Zizyphoides.* S. Societatis Insulae.
511. *Rondeletioides.* S. Ibidem.
512. *Hydrocotyle.* Noua Caledonia.
513. *Coprosma pusilla.* Noua Zeelandia.

VI.

514. *Juncus tenax.* S. Noua Zeelandia.
515. *Rumex flexuosus.* S. Ibidem.

VIII.

516. *Epilobium junceum.* S. Ibidem.
517. *Polygonum imberbe.* S. Societatis insulae.
518. *Polyscias pinnata.* FORST. *Charact. gen.* 32. Tanna.

X.

519. *Oxalis reptans.* S. Societatis insulae et Noua Zeelandia.

XI.

520. *Portulaca lutea.* S. Societatis insulae.
521. *Euphorbia.* Norfolciae insula.

XII.

522. *Eugenia? paniculata.* Tongatabu.
523. *Mesembryanthemum australe.* S. Noua Zeelandia.

XIII.

524. *Ranunculus riuularis.* S. Noua Zeelandia.
525. *Ranunculus hirtus.* S. Ibidem.

XIV.

526. *Stachys decemdentata.* S. Societatis insulae.

527. *Ocymum pusillum.* Tanna.

528. *Scrophularioides arborea.* Societatis et Marchionis insulae.

XV.

529. *Cardamine sarmentosa.* S. Teautea.

XVI.

530. *Geranium patulum.* S. Noua Zeelandia.

531. *Geranium pilosum.* S. Ibidem.

532. *Sida.* Ibidem.

XVII.

533. *Phaseolus amoenus.* S. Societatis insulae.

XIX.

534. *Scorzonera scapigera.* S. Noua Zeelandia.

535. *Gnaphalium redolens.* S. Noua Caledonia.

536. *Baccharis.* Noua Caledonia.

537. *Baccharis* II. Ibidem.

538. *Senecio lautus.* S. Noua Zeelandia.

539. *Senecio angustifolius.* S. Ibidem.

540. *Cotula bicolor.* S. Tanna.

541. *Buphthalmum triflorum.* Norfolciae insula.

542. *Buphthalmum procumbens.* Amicorum insulae.

543. *Coreopsis Helianthoides.* Intra tropicos.

544. *Coreopsis fruticosa.* Ibidem.

545. *Coreopsis.* Tanna.

XX.

546. *Epidendrum distichum.* Societatis insulae.
547. *Epidendrum.* Ibidem.

XXI.

548. *Carex hamata.* Noua Zeelandia.
549. *Carex ternaria.* S. Ibidem.
550. *Carex debilis.* S. Ibidem.
551. *Croton clutioides.* Tanna.
552. *Croton.* Tanna.
553. *Glochidion.* Tanna.
554. *Cucurbita pruriens.* S. Societatis insulae.
555. *Cucurbita aspera.* S. Ibidem.
556. *Cucurbita multiflora.* S. Ibidem.

XXII.

557. *Maba maior.* FORST. *pl. esculent.* 21. Amicorum insulae.
558. *Meryta lanceolata.* FORST. *Charact. gen.* 60. Societatis insulae.
559. *Merista laeuigata.* S. Noua Zeelandia.
560. *Cliffortioides cordata.* S. Noua Zeelandia.
361. *Dacrydium cupressinum.* S. FORST. *pl. escul.* 54. Ibidem.

XXIII.

562. *Andropogon.* Tanna.
563. *Holcus redolens.* S. Noua Zeelandia.
564. *Ixalum inerme.* S. Ibidem.
565. *Mimosa glandulosa.* S. Societatis insulae.
566. *Mimosa.* Noua Caledonia.

567. *Mimosa* II. Ibidem.
568. *Mimosa* III. Ibidem.
569. *Ceodes umbellata.* FORST. *Charact. gen.* 71. Tanna.
570. *Melistaurum distichum.* FORST. *Charact. gen.* 72. Noua Caledonia.
571. *Ficus stipulacea.* Tanna.

XXIV.

572. *Osmunda reptans.* S. Noua Zeelandia.
573. *Osmunda obtusata.* S. Ibidem.
574. *Asplenium polyanthes.* S. Societatis insulae.
575. *Bryum.*
576. *Bryum* II.
577. *Bryum* III.
578. *Hypnum.*
579. *Hypnum* II.
580. *Hypnum* III.
581. *Hypnum* IV.
582. *Hypnum* V.
583. *Iungermannia.*
584. *Lichen.*
585. *Lichen* II.
586. *Lichen* III.
587. *Lichen* IV.
588. *Lichen* V.
589. *Fucus.*
590. *Fucus* II.
591. *Ulva.*

A P P E N D I X.

592. *Areca sapida.* S. Noua Zeelandia. FORST. *pl. esc.* 35.

593. *Mawhaha* radix. COOK *it.* I. 332. 393. FORST. *pl. esc.* 31. Amicorum insulae.

594. *Dgidgi* (Jeejee) radix. COOK l. c. FORST. *pl. esc.* 30. Ibidem.

INDEX.

INDEX.

A

Abrus precatorius No. 267
Acalypha virgata 352
Acanthus ilicifolius 247
Achras diſſecta 155
Achyranthes aſpera 116
Acroſtichum aureum 416
— — dichotomum 415
Adenanthera ſcandens 187
Adenoſtemma viſcoſa 284
Adiantum clauatum 459
— — cuneatum 461
— — pedatum 458
— — trapeziforme 460
Aeſchynomene coccinea 273
Ageratum Conyzoides 285
Agroſtis ouata 40
Aira antarctica 41
Aleurites triloba 360
Amaranthus gangeticus 349
— — tricolor 348
Amomum Curcuma 2
— — Zerumbet 1
Anciſtrum diandrum 52
Andromeda rupeſtris 195
Andropogon 562
Antherieum Adenanthera 149
— — citratum 148
Anthoxanthum crinitum 18
Antirrhinum hexandrum 235
Apium graueolens No. 141
Areca oleracea 488
— ſapida 592
Argophyllum nitidum 115
Arnica oporina 299
Artocarpus inciſa 332
Arum eſculentum 328
— macrorhizon 329
Arundo Bambos 47
— conſpicua 48
Aſcarina polyſtachya 364
Aſclepias volubilis 128
Aſplenium bulbiferum 433
— — caudatum 432
— — flaccidum 426
— — lucidum 427
— — nidus 425
— — obliquum 429
— — obtuſatum 430
— — polyanthes 574
— — polyodon 428
— — tenerum 431
Aſter coriaceus 297
— holoſericeus 296
Auena filiformis 46
Auicennia reſinifera 246

B

Baccharis 536
— ij 537
Baeobotrys

Baeobotrys nemoralis 97
Balanophora fungosa 333
Barringtonia speciosa 255
Bassia obouata 200
Besleria biflora 236
— cymosa 237
Bidens pilosa 283
Blackburnia pinnata 53
Blechnum orientale 422
Boerhaavia erecta 4
— — tetrandra 5
Breynia disticha 400
Bryum 575
— II 576
— III 577
Buphthalmum Helianthoides 304
— — procumbens 542
— — vniflorum 541

C

Calea leptophylla 287
— pinifolia 288
Calendula pumila 305
Calophyllum Inophyllum 225
Campanula gracilis 84
Cardamine sarmentosa 529
Cardiospermum Halicacabum 177
Carex debilis 550
— hamata 548
— lithosperma 339
— ternaria 549
— vncinata 338
Carpodetus serratus 111
Cassia Sophera 184
Cassyta filiformis 181
Casuarina equisetifolia 334
— — nodiflora 335
Ceanothus capsularis No. 112
Celastrus crenatus 113
Celtis orientalis 394
Cenchus echinatus 386
Ceodes vmbellata 569
Cerbera Manghas 120
— — paruiflora 121
Chenopodium triandrum 129
Chiococca barbata 96
Chrysocoma purpurea 286
Cinchona corymbifera 88
Cineraria repanda 295
— — rotundifolia 294
Citrus Aurantium 279
— decumana 280
Clematis hexapetala 230
— — integrifolia 231
Cliffortioides cordata 560
Clusia pedicellata 390
— sessilis 391
Coccoloba australis 176
Cocos nucifera 487
Codia montana 175
Coffea odorata 94
— — opulina 93
— — sambucina 92
— — triflora 95
Coix Lacryma 337
Commelina virginica? 26
Commersonia echinata 144
Conuolunlus brasiliensis 81
— — chrysorrhizus 503
— — coelestis 77
— — corymbosus 80
— — grandiflorus? 76
— — mucronatus 79
— — peltatus 78

Conuoluulus tuguriorum No. 74
— — turpethum 75
Coprosma foetidissima 138
— — lucida 137
— — pusilla 513
Cordia aspera 109
— dichotoma 110
— Sebestena 108
Coreopsis 545
— fruticosa 544
— helianthoides 543
Coriaria sarmentosa 377
Corynocarpus laeuigata 114
Corypha vmbraculifera 486
Cotula bicolor 540
— coronopifolia 300
— minuta 301
Craspedia vniflora 306
Crataeua religiosa 203
Crinum asiaticum 147
Crossostylis biflora 266
Croton 552
— clutioides 551
— Inophyllum 355
— nutans 354
— variegatum 353
Cucurbita aspera, 555
— — lagenaria 362
— — multiflora 556
— — pruriens 554
Cupressus columnaris 351
Cycas circinalis 411
Cynanchum viminale 127
Cynosurus indicus 45
Cyperus linctus 497
— odoratus 27
— stuppeus 396
Cyperus venustus No. 495

D

Dais disperma 192
Daphne foetida 168
— rotundifolia 169
Dentella repens 98
Dianthera caerulea 14
— — clauata 15
Dgidgi (radix) 594
Dicera dentata 226
— ferrata 227
Dichondra repens 134
Dioscorea alata 375
— — bulbifera 376
— — pentaphylla 374
Dodonaea viscosa 164
Dolichos luteolus 269
— pruriens 270
Dorstenia lucida 58
— pubescens 59
Dracaena australis 151
— — indiuisa 150
— — terminalis 152
Dracontium pertusum 331
— — polyphyllum 330

E

Echites costata 123
Ecclipta prostrata 302
Embothrium vmbellatum 60
Epacris fascicularis 72
— juniperina 71
— longifolia 68
— pumila 70
— rosmarinifolia 69

Epidendrum No. 547
— — autumnale 319
— — biflorum 318
— — clypeolum 323
— — crispatum 315
— — distichum 546
— — equitans 316
— — fasciola 320
— — myosurus 317
— — refupinatum 322
— — trifte 314
— — tuberosum 313
— — vmbellatum 321
Epilobium glabellum 160
— — junceum 516
— — rotundifolium 161
Erithalis obouata 101
Erythrina Corallodendron 268
Eugenia malaccensis 220
— paniculata 522
— racemosa 221
Euphorbia 521
— — Aloto 207
— — glauca 208
— — origanoides 206
Euphrasia cuneata 234
Furyandra scandens 228
Excoecaria Agallocha 368

F

Fagara Euodia 54
Ficus aspera 404
— Granatum 408
— indica 406
— obliqua 409
— prolixa 410
— religiosa 402
Ficus scabra No. 403
— septica 407
— stipulacea 571
— tinctoria 405
Forstera sedifolia 324
Fucus 589
— II. 590

G

Gahnia procera 158
— Schoenoides 159
Galega littoralis 277
Galium vmbrosum 500
Gardenia florida 122
Gaulthieria antipoda 196
Genioftoma rupestris 103
Gentiana saxosa 132
— — montana 133
Geranium patulum 530
— — pilosum 531
Glochidion 553
— — ramiflorum 361
Glycine lucida 272
— rosea 271
Gnaphalium inuolucratum 291
— — lanatum 290
— — luteo-album 298
— — redolens 535
— — trinerue 289
Gossypium religiosum 259
Gratiola Monnieria 16
Grewia Mallococca 327
Grisselinia lucida 401
Guaiacum dubium 186
Guettarda speciosa 3[illegible]
Guilandina Bonduccella 185
Gynopogon Alyxia 118

Gynopogon ſcandens No. 119
— — ſtellatum 117

H

Haloragis alata 180
— proſtrata 179
Hedycarya dentata 379
Hedyſarum heterocarpon 275
— — lagopodioides 276
— — vinbellatum 274
Hemionitis reticulata 423
Hernandia ſonora 340
Hibiſcus Abelmoſchus 263
— — bacciferus 260
— — eſculentus 264
— — haſtatus 265
— — Roſa ſinenſis 262
— — tiliaceus 261
Holcus redoleus 563
Hydrocotyle 512
— — moſchata 135
Hypericum gramineum 281
Hypnum 578
— II 579
— III 580
— IV 581
— V 582

I

Iaſminum 490
— — didymum 8
— — ſimplicifolium . 7
Inocarpus edulis 197
Ipomoea Bona nox 82
— carnea 83
Iſchaemum inuolutum 585
— — murinum 584
Iſchaemum muticum No. 383
Iuncus campeſtris 154
— tenax 514
Iungermannia 583
Iuſticia longifolia 13
— repanda 12
Ixalum inerme 564

K

Kyllinga monocephala 30
— — triceps 31

L

Laſerpitium Aciphylla 139
Lawſonia Acronychica 165
Lepidium oleraceum 248
— — piſcidium 249
Lichen 584
— II 585
— III 586
— IV 587
— V 588
Liguſticum Gingidium 140
Limonia lucida 191
— minuta 190
Linum monogynum 145
Lithoſpermum incanum 63
Lobelia angulata 307
— arborea 308
Louchitis tenuifolia 424
Loranthus Stelis 157
— — tetrapetalus 156
Lotus arboreus 278
Lycopodium cernuum 480
— — complanatum 481
— — flabellatum 483
— — myrtifolium 485

Lycopodium nudum No.477
— — phlegmaria 478
— — ſcarioſum 484
— — ſquarroſum 479
— — volubile 482
Lyſimachia decurrens 65
Lythrum Pemphis 205

M

Maba elliptica 366
— maior 557
Mawhaha (radix) 593
Melaleuca aeſtuoſa 215
— — ciliata 217
— — diffuſa 213
— — florida 214
— — Leucadendron 218
— — lucida 216
— — perforata 212
— — ſcoparia 210
— — virgata 211
Melaſtoma glabra 194
— — malabathrica 193
Melicope ternata 166
Melicytus ramiflorus 371
Meliſtaurum diſtichum 570
Melochia odorata 253
Melodinus ſcandens 125
Meniſpermum japonicum 378
Menyanthes 502
Meriſta laeuigata 559
Meryta lanceolata 558
Meſembryanthemum auſtrale 523
Mimoſa 566
— II 567
— III 568
— glanduloſa 565
Mimoſa Mangium 393
Mniarum hiſtorum 6
Morinda citrifolia 100
— vmbellata 99
Morus papyrifera 347
Muſa paradiſiaca 382
Muſſaenda frondoſa 102
Myoporum craſſifolium 240
— — laetum 238
— — pubeſcens 239
— — tenuifolium 241
Myoſotis ſpatulata 62

N

Nauclea orientalis 85
Nertera depreſſa 501
Nicotiana fruticoſa? 104

O

Ocymum puſillum 527
— — Scutellarioides 233
Oldenlandia debilis 56
— — foetida 55
— — tenuifolia 57
Ophiorrhiza ſubumbellata 66
Ophiogloſſum ſcandens 412
Ophrys ſquamata 310
— vnifolia 311
Oſmunda diſcolor 413
— — obtuſata 573
— — procera 414
— — reptans 572
Oxalis reptans 519

P

Panax arboreum 398
— ſimplex 399

Pandanus odoratiſſima No. 365
Panicum compoſitum 39
— — filiforme 38
— — hiſpidum 36
— — ſanguinale 37
Parietaria debilis 387
Paſpalum orbiculare 35
Paſſerina Gnidia 170
— — piloſa 171
— — proſtrata 172
Paſſiflora aurantia 326
Pennantia corymboſa 396
Periploca capſularis 126
Peteſia carnea 51
Peucedanum geniculatum 136
Phalaris canarienſis 34
Phaſeolus amoenus 533
Phormium tenax 153
Phyllanthus virgata 341
Phyſalis flaccida 506
Piper acuminatum? 23
— excelſum 20
— latifolium 22
— methyſticum 21
— pallidum 24
— Siriboa 19
— tetraphyllum 25
Piſonia inermis 397
Plagianthus divaricatus 254
Plumbago Zeylanica 73
Poa anceps 43
— caeſpitoſa 498
— Eragroſtis? 42
— imbecilla 499
— latifolia 44
Polygonum imberbe 517
Polypodium Acroſtichoides 434
Polypodium adiantiforme No. 449
— — affine 455
— — arboreum 451
— — ariſtatum 448
— — dealbatum 454
— — dichotomum 450
— — diſſectum 441
— — euectum 438
— — extenſum 453
— — hirſutulum 439
— — innatum 443
— — latifolium 457
— — lunulatum 456
— — medullare 452
— — nudum 446
— — nymphale 442
— — pennigerum 444
— — puſtulatum 436
— — ſcandens 437
— — ſerpens 435
— — ſetoſum 447
— — tenellum 440
— — veſtitum 445
Polyſcias pinnata 518
Pometia pinnata 392
— ternata 393
Portlandia tetrandra 86
Portulaca lutea 520
Piſidium Decaſpermum 219
Pſychotria aſiatica 90
— — herbacea 91
— — ſpecioſa 89
Pteris comans 419
— eſculenta 418
— humilis 421
— pedata 417
— rotundifolia 420

R

Ranunculus hirtus 525
— — riuularis 524
Reſtis ſimplex 367
Rhamnus polifolius 509
— — Zizyphoides 510
Rhizophora gymnorhiza 201
— — Mangle 202
Rhus atrum 142
Ricinus dioicus 357
— — Mappa 356
Rondeletioides 511
Rottbölla Coelorachis 49
— — repens 50
Rubus auſtralis 224
Ruellia fragrans 243
— — reptans 242
Rumex flexuoſus 515

S

Saccharum officinarum 33
— — ſpontaneum 32
Salicornia auſtralis 489
Salſola Kali 130
— fruticoſa 131
Sapindus Saponaria 178
Scaeuola Lobelia 87
— — ſaligna 505
— — ſericea 504
Schefflera digitata 146
Schoenus arundinaceus 491
— — eleuatus 494
— — rubiginoſus 493
— — ſurinamenſis 492
Scirpus dichotomus 28
— junceus 29
Scorzonera ſcapigera 534
Scrophularioides arborea No. 528
Senecio anguſtifolius 539
— lautus 538
Serapias regularis 312
Seſuvium Portulacaſtrum 222
Shawia paniculata 307
Sheffieldia repens 67
Sicyos angulata 368
Sida 502
— indica 257
— rhombifolia 256
Sigesbeckia orientalis 303
Siſymbrium heterophyllum 250
Siſyrinchium Ixioides 325
Skinnera excorticata 163
Smilax purpurata 373
— Ripogonum 372
Solanum aſtroites 508
— — auiculare 107
— — nigrum 106
— — repandum 105
— — viride 507
Solidago arboreſcens 298
Sonchus oleraceus 282
Sophora tomentoſa 182
— — tetraptera 183
Spondias dulcis 198
Stachys decemdentata 526
Sterculia Balanghas 358
— — foetida 359
Suriana maritima 199

T

Tabernaemontana citrifolia 124
Tacca pinnatifida 209
Terminalia Catappa 388
— — glabrata 389

Tetragonia halimifolia No. 223
Teucrium villosum 232
Thalia cannaeformis 3
Tillaea muscosa? 61
Tournefortia argentea 64
Trichilia alliacea 189
— spectabilis 188
Trichomanes biualue 466
— — contiguum 463
— — cuneiforme 469
— — demissum 468
— — demissum 467
— — elatum 474
— — epiphyllum 471
— — flaccidum 472
— — gibberosum 470
— — humile 464
— — multifidum 473
— — reniforme 462
— — sanguinolentum 465
— — solidum 475
— — squarrosum 476
Triumfetta procumbens 204
Typha latifolia 336

U

Ulva 591
Urena lobata 258
Urtica aestuans 342
Urtica argentea No. 343
— ferox 346
— ruderalis 344
— virgata 345

V

Vaccinium cereum 167
Verbena nodiflora 17
Veronica Catarractae 9
— — elliptica 10
— — salicifolia 11
Viscum antarcticum 370
— opuntioides 309
Vitex trifolia 245
Volkameria inermis 244

W

Waltheria indica 251
— — Lopanthus 252
Weinmannia racemosa 173
— — paruiflora 174
Wintera axillaris 229

X

Xeranthemum Bellidioides 293
Ximenia elliptica 162
Xylophylla longifolia 143
Xylosma orbiculatum 381
— — suaueolens 380